

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Казахстанский филиал



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
В КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ МГУ



Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Казахстанский филиал

Вступительное испытание по математике
Пособие для поступающих
в Казахстанский филиал МГУ

Астана
2018

УДК 373.167.1

ББК 22.1я72

Б15

*Рекомендовано к печати Ученым советом
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова*

Авторы пособия: преподаватели кафедры математики и информатики Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова

Баев Ален Жуматаевич,

Васильев Антон Николаевич,

Галиева Нургуль Кадыржановна.

Рецензенты: кафедра математики и информатики Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова; доцент кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Клячко А. А.

Вступительное испытание по математике: пособие для поступающих в Казахстанский филиал МГУ / А. Ж. Баев, А. Н. Васильев, Н. К. Галиева. — Астана, 2018. — 109 с.

ISBN 978-601-7804-61-9

Данное пособие предназначено для поступающих в Казахстанский филиал МГУ, учителей и выпускников средних школ. В пособии содержатся подробные решения задач, предложенных абитуриентам на вступительном экзамене по математике в 2011–2018 годах.

УДК 373.167.1

ББК 22.1я72

©Тексты решений, оригинал-макет:

Баев А.Ж., Васильев А.Н., Галиева Н.К., 2018

©Тексты условий:

ЦПК МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Московский университет — старейший и крупнейший университет России, один из ведущих университетов мира. Он внес огромный вклад в развитие мировой науки, образования и культуры и является одним из престижных университетов мира.

Казахстанский филиал МГУ — структурное подразделение Московского университета на территории Республики Казахстан. Филиал создан по инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

В Казахстанском филиале МГУ создана уникальная система образования, которая гарантирует высокое качество обучения студентов. Это достигается как полным соблюдением учебных программ Московского университета в Филиале, так и тем, что учебный процесс в Филиале обеспечивается в основном профессорами и преподавателями МГУ. Ежегодно более 120 профессоров и преподавателей МГУ командированы Московским университетом в Филиал для чтения лекций и проведения семинаров.

Все студенты Филиала на старших курсах обучаются в МГУ и получают диплом об окончании Московского университета. На время обучения в Москве им предоставляются места в общежитиях МГУ.

Выпускники Казахстанского филиала работают в различных ведомствах, институтах и национальных компаниях Республики Казахстан, успешно занимаются бизнесом.

Приглашаем поступать в Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

**Директор
Казахстанского филиала МГУ
профессор**

А. В. СИДОРОВИЧ

Содержание

1	Введение	6
1.1	Экзамен по математике	6
1.2	Программа экзамена и предъявляемые требования	7
1.3	Литература	10
1.4	Электронные ресурсы	11
2	Условия	12
2.1	2011 год	12
2.2	2012 год	14
2.3	2013 год	16
2.4	2014 год	18
2.5	2015 год	20
2.6	2016 год	22
2.7	2017 год	24
2.8	2018 год	26
3	Решения	28
3.1	2011 год	28
3.2	2012 год	37
3.3	2013 год	47
3.4	2014 год	56
3.5	2015 год	66
3.6	2016 год	74
3.7	2017 год	84
3.8	2018 год	95
4	Ответы	106

Введение

На сегодняшний день невозможно представить нашу жизнь без научно-технического прогресса. Наука играет важнейшую роль практически во всех областях человеческой деятельности, являясь её фундаментом. Также верно и то, что современная наука немыслима без математики: математические методы все больше и больше проникают в те её сферы, в которых какую-нибудь сотню-другую лет назад с ними были абсолютно незнакомы. Это и общественные науки, и медицина, и даже лингвистика. Поэтому неудивительно, что в МГУ имени М.В. Ломоносова — флагмане фундаментального образования на постсоветском пространстве — без знания математики невозможно поступить практически ни на один факультет. Без её успешного освоения невозможно формирование полноценного специалиста.

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова на сегодня имеет пять направлений подготовки: математика, прикладная математика и информатика, экономика, экология и природопользование, филология. При поступлении на первые четыре необходимо успешно сдать экзамен по математике.

Экзамен по математике

Вступительный экзамен по математике Казахстанского филиала проводится в письменной форме. Продолжительность экзамена составляет 4 часа. Максимальная оценка за экзамен — 100 баллов. Вариант состоит из восьми задач различной сложности: задача на арифметические преобразования, четыре задачи на стандартные алгебраические приемы, одна алгебраическая задача повышенной сложности и по одной задаче на планиметрию и стереометрию. Каждая задача оценивается по следующей шкале:

$\boxed{+}$ — полное решение, подробные выкладки, абсолютно верный ответ;

$\boxed{\pm}$ — полное решение с неполными выкладками или арифметической ошибкой, которая не влияет на дальнейший ход решения;

\boxplus — неполное решение, которое содержит некоторые случаи из правильного решения, или решение с арифметической ошибкой, которая существенно меняет дальнейший ход решения;

\boxminus — неверное решение, отсутствие продвижений за исключением тривиальных.

Объем знаний и степень владения материалом, описанные в программе, соответствуют курсу математики средней школы. Поступающий может пользоваться арсеналом средств из этого курса, включая и начала анализа. Однако для решения экзаменационных задач достаточно уверенного владения лишь теми понятиями и их свойствами, которые перечислены в настоящей программе. Объекты и факты, не изучаемые в общеобразовательной школе, также могут использоваться поступающими, но при условии, что он способен их пояснять и доказывать.

Программа экзамена и предъявляемые требования

Понятия, которыми должен владеть абитуриент:

1. Натуральные числа. Делимость. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
2. Целые, рациональные и действительные числа.
3. Формулы сокращенного умножения.
4. Квадратные уравнения. Дискриминант. Теорема Виета.
5. Квадратные неравенства. Парабола.
6. Проценты.
7. Модуль числа.
8. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов.
9. Степень, корень, арифметический корень.

10. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы.
11. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
12. Координатная плоскость. Уравнение прямой и окружности.
13. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
14. Тригонометрический круг.
15. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения аргумента. Формулы двойных углов. Формулы синуса (косинуса, тангенса, котангенса) суммы и разности. Формулы суммы синусов (косинусов, тангенсов и котангенсов). Формулы произведения синусов (косинусов).
16. Логарифм.
17. Функция, ее область определения и область значений. Возрастание, убывание, периодичность, четность, нечетность. Наибольшее и наименьшее значения функции. График функции.
18. Уравнение, неравенство, система. Решения (корни) уравнения, неравенства, системы. Равносильность.
19. Задачи с параметром.
20. Треугольник. Медиана, биссектриса, высота и их свойства.
21. Прямоугольный треугольник и его свойства. Теорема Пифагора.
22. Формулы площади треугольников.
23. Теорема синусов. Теорема косинусов.
24. Квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, трапеция и их свойства.

25. Правильный многоугольник.
26. Окружность и круг. Касательная, секущая, хорда. Круговой сектор и сегмент. Центральный и вписанные углы.
27. Вписанные и описанные четырехугольники и их свойства.
28. Прямая и плоскость в пространстве. Двугранный угол. Трехгранный угол. Теорема о трех перпендикулярах.
29. Многогранник. Куб, параллелепипед, призма, пирамида.
30. Цилиндр, конус, шар, сфера.
31. Площадь поверхности и объем тетраэдра, цилиндра, конуса, шара.

На экзамене по математике поступающий должен уметь:

1. выполнять без калькулятора действия над числами и числовыми выражениями;
2. преобразовывать буквенные выражения;
3. сравнивать числа и находить их приближенные значения без калькулятора;
4. доказывать тождества и неравенства для буквенных выражений;
5. решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и исследовать их решения;
6. исследовать функции; строить графики функций и множества точек на координатной плоскости, заданные уравнениями и неравенствами;
7. пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, свойствами арифметической и геометрической прогрессий;

8. пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, степени, корни, логарифмические, тригонометрические выражения, величины углов, длины, площади, объемы;
9. изображать геометрические фигуры на чертеже;
10. делать дополнительные построения;
11. применять признаки равенства, подобия фигур и их принадлежности к тому или иному виду;
12. пользоваться свойствами геометрических фигур, их характерных точек, линий и частей, свойствами равенства, подобия и взаимного расположения фигур;
13. составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, исходя из условия задачи;
14. излагать и оформлять решение логически правильно, полно и последовательно, с необходимыми пояснениями.

Литература

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному экзамену:

1. Будаков А.Б., Щедрин Б.М. Элементарная математика: Методические указания к ответам на теоретические вопросы билетов устного экзамена по математике. — М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова, 2007.
2. Разгулин А.В., Федотов М.В. Алгебра: Учебно-методическое пособие. — М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова, 2007.
3. Воронин В.П., Федотов М.В. Геометрия: Учебно-методическое пособие. — М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова, 2006.

4. Ткачук В.В. Математика абитуриенту. — М.: МЦНМО, 2007.
5. Куланин Е.Д., Норин В.П., Федин С.Н., Шевченко Ю.А. 3000 конкурсных задач по математике. — М.: Айрис-пресс, 2003.

Электронные ресурсы

Следующие электронные ресурсы будут полезны для ознакомления с вариантами, предложенными в разные годы в различных подразделениях МГУ:

- Официальный сайт Центральной приемной комиссии МГУ:
<http://срк.msu.ru/>
- Официальный сайт Приемной комиссии мехмата МГУ:
<http://pk.math.msu.ru/ru/specialist/variant>

Желаем успехов!

Условия**2011 год**

1 вариант

1. Какие из чисел $2, \frac{3}{4}, \sqrt{7} + 2, \sqrt{7} - 2$ являются корнями уравнения

$$4x^3 + 9 = 19x^2?$$

2. Представьте число $\sqrt{33}$ в виде десятичной дроби с точностью до 0,1.

3. Решите уравнение

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right) - \sin(\pi + 4x) = \sin 4x + \sin x.$$

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4^x \cdot 32^y = 256, \\ \sqrt{2x-2} = y. \end{cases}$$

5. В арифметической прогрессии 34 члена, и разность этой прогрессии равна 12. Сумма всех членов прогрессии в 4 раза больше, чем сумма членов, стоящих на нечетных местах. Найдите первый член этой прогрессии.

6. В трапеции, описанной около окружности радиуса 4, разность длин боковых сторон равна 4, а длина средней линии равна 12. Найдите длины сторон трапеции.

7. Решите неравенство

$$\frac{\log_2(x+6) \cdot \log_5(x+5)}{x+4} \leq \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{x+3}.$$

8. В пирамиде $ABCD$: $AB = 1, AC = 2, AD = 3, BC = \sqrt{5}, BD = \sqrt{10}, CD = \sqrt{13}$. Найдите радиус шара, вписанного в пирамиду $ABCD$.

2 вариант

1. Какие из чисел 2 , $-\frac{2}{3}$, $\sqrt{5} + 3$, $\sqrt{5} - 3$ являются корнями уравнения

$$3x^3 = 16x^2 - 8?$$

2. Представьте число $\sqrt{39}$ в виде десятичной дроби с точностью до 0,1.
3. Решите уравнение

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right) + \sin(\pi - 3x) = \sin 3x - \cos x.$$

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 8^x \cdot 64^y = 128, \\ \sqrt{12y - 7} = x. \end{cases}$$

5. В арифметической прогрессии 26 членов, и разность этой прогрессии равна 15. Сумма всех членов прогрессии в 5 раз больше, чем сумма членов, стоящих на нечетных местах. Найдите первый член этой прогрессии.
6. В трапеции, описанной около окружности радиуса 6, разность длин боковых сторон равна 4, а длина средней линии равна 15. Найдите длины сторон трапеции.
7. Решите неравенство

$$\frac{\log_3(x-3) \cdot \log_4(x-4)}{x-5} \leq \frac{\log_4(x-3) \cdot \log_3(x-4)}{x-6}.$$

8. В пирамиде $ABCD$: $AB = 1$, $AC = 3$, $AD = 4$, $BC = \sqrt{10}$, $BD = \sqrt{17}$, $CD = 5$. Найдите радиус шара, вписанного в пирамиду $ABCD$.

2012 год

1 вариант

1. Определите, какие из чисел являются целыми, и вычислите эти целые числа:

а) $\frac{19}{7} + \frac{7}{5} - \frac{4}{35}$;

б) $\sqrt{22} \cdot \sqrt{33} \cdot \sqrt{6}$;

в) $\frac{2,9 \cdot 3,4}{4,93}$.

2. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + 24} = 6 - x^2.$$

3. Решите уравнение

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 |\cos x + \sin x| = \frac{\pi^2}{4} (\cos x + \sin x).$$

4. В арифметической прогрессии десятый член больше пятого члена на 15 и больше второго члена в 13 раз. Найдите сумму всех членов этой прогрессии, начиная с сотого члена и заканчивая двухсотым.

5. Решите неравенство

$$\log_7 x \leq 5 + 2 \log_{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{7}\right).$$

6. В выпуклом шестиугольнике все углы равны 120° и четыре последовательные стороны имеют длины 2, 3, 3, 4. Найдите площадь шестиугольника.

7. Найдите все значения, которые принимает функция

$$f(x) = \frac{2x^2 + x + 1}{3x^2 - x + 1}.$$

8. Кусок сыра в форме правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ (S — вершина пирамиды) разрезали одним плоским разрезом, который проходит через ребро AB и делит ребро SC в отношении 1 : 3, считая от вершины S . Найдите отношение объемов полученных кусков сыра.

2 вариант

1. Определите, какие из чисел являются целыми, и вычислите эти целые числа:

а) $\frac{11}{3} + \frac{9}{11} + \frac{17}{33}$;

б) $\sqrt{14} \cdot \sqrt{35} \cdot \sqrt{10}$;

в) $\frac{3,1 \cdot 3,8}{5,89}$.

2. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + 12} = 8 - x^2.$$

3. Решите уравнение

$$\left(x + \frac{\pi}{2}\right)^2 |\cos x - \sin x| = \frac{\pi^2}{4} (\cos x - \sin x).$$

4. В арифметической прогрессии девятый член больше четвертого члена на 10 и больше третьего члена в 5 раз. Найдите сумму всех членов этой прогрессии, начиная с двухсотого члена и заканчивая трехсотым.

5. Решите неравенство

$$3 \log_{\sqrt{x}} 11 \leq 8 + 2 \log_{11} \left(\frac{1}{x}\right).$$

6. В выпуклом шестиугольнике все углы равны 120° и четыре последовательные стороны имеют длины 4, 5, 5, 6. Найдите площадь шестиугольника.

7. Найдите все значения, которые принимает функция

$$f(x) = \frac{3x^2 + x + 1}{2x^2 - x + 1}.$$

8. Кусок сыра в форме правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ (S — вершина пирамиды) разрезали одним плоским разрезом, который проходит через ребро AB и делит ребро SC в отношении 2 : 3, считая от вершины S . Найдите отношение объемов полученных кусков сыра.

2013 год

1 вариант

1. Докажите, что число

$$\left(\sqrt[3]{9} - \sqrt[6]{3}\right)^3 \cdot \left(9 + 5\sqrt{3}\right)$$

является целым и найдите это целое число.

2. Решите неравенство

$$\frac{13 \cdot |x + 2| - 5}{2 \cdot |x + 2| + 1} < 4.$$

3. Решите уравнение

$$2 + \cos(\pi + 9x) = 5 \sin \frac{\pi - 9x}{2}.$$

4. В возрастающей арифметической прогрессии произведение седьмого и восьмого членов на 46 больше, чем произведение пятого и девятого членов, и на 108 больше, чем произведение третьего и десятого членов. Чему равна сумма первых 25 членов этой прогрессии?

5. Решите неравенство

$$(18 - 3x) \cdot \log_{2x-12} \sqrt[3]{2} \leq 1.$$

6. В трапеции $ABCD$ длина основания AD равна 20, а длина боковой стороны CD равна $10\sqrt{3}$. Через точки A , B , C проходит окружность, пересекающая основание трапеции AD в точке F . Угол AFB равен 60° . Найдите длину отрезка BF .

7. Произведение двух натуральных чисел уменьшили на 26. Результат разделили на сумму исходных натуральных чисел с остатком. В частном получили 5, а в остатке 60. Найдите исходные натуральные числа.

8. Квадрат $ABCD$ со стороной 3 см является основанием двух пирамид $MABCD$ и $NABCD$, причем MA и NC — высоты этих пирамид и точки M , N лежат по одну сторону от плоскости $ABCD$. Сумма длин высот MA и NC равна 9 см, а объем общей части пирамид равен 6 см^3 . Найдите отношение высот MA и NC .

2 вариант

1. Докажите, что число

$$\left(\sqrt[3]{4} - \sqrt[6]{2}\right)^3 \cdot (20 + 14\sqrt{2})$$

является целым и найдите это целое число.

2. Решите неравенство

$$\frac{11 \cdot |x + 3| - 6}{6 \cdot |x + 3| + 5} < 1.$$

3. Решите уравнение

$$\cos(11x - \pi) = 4 + 7 \sin \frac{\pi - 11x}{2}.$$

4. В возрастающей арифметической прогрессии произведение шестого и седьмого членов на 44 больше, чем произведение четвертого и восьмого членов, и на 104 больше, чем произведение второго и девятого членов. Чему равна сумма первых 23 членов этой прогрессии?

5. Решите неравенство

$$(6 - 2x) \cdot \log_{3^x - 6} \sqrt{3} \leq 1.$$

6. В трапеции $ABCD$ длина боковой стороны CD равна 6. Через точки A , B , C проходит окружность, пересекающая основание трапеции AD в точке F . Длина отрезка BF равна $6\sqrt{2}$. Угол AFB равен 45° . Найдите длину основания AD .

7. Произведение двух натуральных чисел уменьшили на 25. Результат разделили на сумму исходных натуральных чисел с остатком. В частном получили 4, а в остатке 50. Найдите исходные натуральные числа.

8. Квадрат $ABCD$ со стороной 6 см является основанием двух пирамид $MABCD$ и $NABCD$, причем MA и NC — высоты этих пирамид и точки M , N лежат по одну сторону от плоскости $ABCD$. Сумма длин высот MA и NC равна 8 см, а объем общей части пирамид равен 18 см^3 . Найдите отношение высот MA и NC .

2014 год

1 вариант

1. К какому целому числу находится ближе всего на числовой оси число

$$\frac{5,1 \cdot 4,2 + 11,76}{2,3 \cdot 2,2 - 2,46}?$$

2. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt{41 - 6x - x^2}}{3 - x} = 1.$$

3. Решите уравнение

$$6 \sin^2 3x + 2 \cos^2 6x = 5.$$

4. Даны арифметическая прогрессия, в которой разность отлична от 0, и геометрическая прогрессия. Известно, что 1-й, 2-й и 10-й члены арифметической прогрессии совпадают, соответственно, со 2-м, 5-м и 8-м членами геометрической прогрессии. Найдите отношение суммы 8 первых членов геометрической прогрессии к сумме 8 первых членов арифметической прогрессии.

5. Решите неравенство

$$\log_{x^2} \left(5x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right)^2 \leq 2.$$

6. Высота AH и биссектриса BL в треугольнике ABC пересекаются в точке K . При этом $AK = 4$, $KH = 2$, $BL = 11$. Найдите длину стороны BC .

7. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$a(x^2 + x^{-2}) - (a + 1)(x + x^{-1}) + 5 = 0$$

не имеет решений.

8. В треугольной пирамиде $ABCD$ суммы трех плоских углов при каждой из вершин B и C равны 180° и $AD = BC$. Длина высоты пирамиды, опущенной из вершины A , равна 40 см. Найдите радиус шара, вписанного в эту пирамиду.

2 вариант

1. К какому целому числу находится ближе всего на числовой оси число

$$\frac{7,2 \cdot 3,1 + 10,14}{3,2 \cdot 2,1 - 4,52}?$$

2. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt{22 - 4x - x^2}}{2 - x} = 1.$$

3. Решите уравнение

$$7 \sin^2 5x + \cos^2 10x = 2.$$

4. Даны арифметическая прогрессия, в которой разность отлична от 0, и геометрическая прогрессия. Известно, что 2-й, 3-й и 11-й члены арифметической прогрессии совпадают, соответственно, с 1-м, 4-м и 7-м членами геометрической прогрессии. Найдите отношение суммы 9 первых членов геометрической прогрессии к сумме 9 первых членов арифметической прогрессии.

5. Решите неравенство

$$\log_{x^2} \left(2x^2 + \frac{13}{2}x - \frac{15}{2} \right)^2 \leq 2.$$

6. Высота CH и биссектриса BL в треугольнике ABC пересекаются в точке K . При этом $CK = 8$, $KH = 4$, $BL = 18$. Найдите длину стороны AB .

7. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$a(x^2 + x^{-2}) - (a + 2)(x + x^{-1}) + 7 = 0$$

не имеет решений.

8. В треугольной пирамиде $ABCD$ суммы трех плоских углов при каждой из вершин B и D равны 180° и $AC = BD$. Радиус шара, вписанного в эту пирамиду, равен 3 см. Найдите длину высоты пирамиды, опущенной из вершины A .

2015 год

1 вариант

1. Какое из чисел больше и почему: 4,5 или $\sqrt{\frac{21}{8}} + \frac{17}{6}$?

2. Решите уравнение

$$(x^2 - 8x + 16)(x^2 - 8x + 18) - 24 = 0.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{24} \cos x = \sqrt{11 \cos x - \cos 2x}.$$

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y^2 + 2xy = 40x, \\ 16x^2 + 8xy = 5y. \end{cases}$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\log_{25} \left(7 - \frac{x}{2}\right)}{\log_{125} (22 - x)} \leq \frac{3}{4}.$$

6. В треугольнике длины двух сторон равны 4 и 5, а длина биссектрисы угла между этими сторонами равна $\frac{20}{9}$. Найдите площадь этого треугольника.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(x + 1)^4 - (a + 3)(x^2 + 2x) + a^2 + 3a + 1 = 0$$

имеет 4 различных корня, образующих арифметическую прогрессию.

8. В правильной шестиугольной пирамиде с вершиной S и основанием $ABCDEF$ площадь сечения SAC относится к площади боковой грани SAB как $\sqrt{51} : \sqrt{19}$. Сторона основания равна 3. Найти объем данной шестиугольной пирамиды.

2 вариант

1. Какое из чисел больше и почему: $5,5$ или $\sqrt{\frac{20}{7}} + \frac{23}{6}$?

2. Решите уравнение

$$(x^2 - 7x + 16)(x^2 - 7x + 19) - 28 = 0.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{20} \sin x = \sqrt{9 \sin x + \cos 2x}.$$

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2y^2 + xy = 15x, \\ 5x^2 + 10xy = 12y. \end{cases}$$

5. Решите неравенство

$$\frac{\log_{64} \left(5 + \frac{x}{2}\right)}{\log_{16} (18 + x)} \leq \frac{1}{3}.$$

6. В треугольнике длины двух сторон равны 8 и 3, а длина биссектрисы угла между этими сторонами равна $\frac{24}{11}$. Найдите площадь этого треугольника.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(x - 1)^4 - (a + 4)(x^2 - 2x) + a^2 + 5a + 5 = 0$$

имеет 4 различных корня, образующих арифметическую прогрессию.

8. В правильной шестиугольной пирамиде с вершиной S и основанием $ABCDEF$ площадь сечения SAC относится к площади боковой грани SAB как $\sqrt{37} : \sqrt{13}$. Сторона основания равна 2. Найдите объем данной шестиугольной пирамиды.

2016 год

1 вариант

1. Сколько различных решений имеет уравнение

$$7x^2 + 6x + 7 = 2\sqrt{10} \cdot (x^2 - 1)?$$

2. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 5, \\ x^3 - y^3 = 335. \end{cases}$$

3. Дана квадратная таблица 10×10 клеток (10 строк, 10 столбцов). В каждой клетке таблицы стоит число. Известно, что при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку, расположенную ниже, число увеличивается на 4, а при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку справа число уменьшается на 1. Сумма всех чисел в таблице равна 250. Какое число стоит в самой левой клетке нижнего ряда?

4. Решите неравенство

$$\sqrt{7 + 2^{\log_x 5}} \geq 1 + 4^{\log_x \sqrt{5}}.$$

5. Решите уравнение

$$\operatorname{tg} 2x = 9 \sin^2 x + 4 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x.$$

6. В четырехугольнике $ABCD$ сторона AD в $\sqrt{\frac{19}{4}}$ раз длиннее стороны BC и $AB = CD = 2$. Продолжения сторон AB (за точку B) и DC (за точку C) пересекаются в точке K , при этом $BK = 1$, $CK = 2$. Найдите площадь четырехугольника $ABCD$.

7. Найдите все целочисленные решения уравнения

$$\cos \frac{(10x - 48)\pi}{3x + 5} = 1.$$

8. В правильной треугольной пирамиде радиус вписанного шара в 3 раза короче высоты и равен $7 + \sqrt{21}$. Найдите радиус шара, который касается всех ребер пирамиды.

2 вариант

1. Сколько различных решений имеет уравнение

$$9x^2 + 4x + 9 = \sqrt{77} \cdot (1 - x^2)?$$

2. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 6, \\ x^3 - y^3 = 342. \end{cases}$$

3. Дана квадратная таблица 8×8 клеток (8 строк, 8 столбцов). В каждой клетке таблицы стоит число. Известно, что при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку, расположенную ниже, число уменьшается на 2, а при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку справа число увеличивается на 3. Сумма всех чисел в таблице равна 160. Какое число стоит в самой правой клетке верхнего ряда?

4. Решите неравенство

$$\sqrt{31 + 5^{\log_x 3}} \geq 1 + 25^{\log_x \sqrt{3}}.$$

5. Решите уравнение

$$\operatorname{tg} 2x = 6 \cos^2 x - 4 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x.$$

6. В четырехугольнике $ABCD$ сторона AD в $\sqrt{\frac{23}{12}}$ раз длиннее стороны BC и $AB = CD = 1$. Продолжения сторон AB (за точку B) и DC (за точку C) пересекаются в точке K , при этом $BK = 2$, $CK = 3$. Найдите площадь четырехугольника $ABCD$.

7. Найдите все целочисленные решения уравнения

$$\cos \frac{(4x - 50)\pi}{3x + 7} = 1.$$

8. В правильной треугольной пирамиде радиус вписанного шара в 3 раза короче высоты и равен $\sqrt{21} + 3$. Найдите радиус шара, который касается всех ребер пирамиды.

2017 год

1 вариант

1. Найдите все целые числа, которые лежат между числами $\sqrt{3} \cdot \sqrt{85}$ и $\frac{14-1,7}{3-2,3}$.
2. Решите уравнение $|x^2 - 14x + 48| = 14x - 42 - x^2$.
3. В 9 коробках с номерами от 1 до 9 лежат только красные и синие шары. Число красных шаров во второй коробке в $\frac{7}{6}$ раз больше, чем в первой. Количество красных шаров в коробках образуют арифметическую прогрессию, а количества синих шаров в коробках образуют геометрическую прогрессию (в порядке номеров коробок). Количество синих шаров в первой коробке составляет 25%, а в третьей — 50% от числа всех шаров в данной коробке. Найти отношение общего числа синих шаров к общему числу красных шаров.
4. Решите уравнение

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^{\log_y x} = \frac{y^2}{x}, \\ (\log_3 x^2) \cdot \log_x\left(2x - \frac{3}{y}\right) = 4 \end{cases}$$

6. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ $\angle B = \angle C = 60^\circ$, $AD = 21$, $BC = 40$. Окружность с центром на стороне BC касается сторон AB , AD и CD . Найдите длины сторон AB и CD .
7. Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$13 + \sin^2 x > 3a^2 - a + (4a - 5) \cos x$$

выполняется для всех x .

8. В правильную четырехугольную пирамиду $SABCD$ (S — вершина пирамиды) вписан шар. Через центр шара и ребро AB проведена плоскость, которая в пересечении с пирамидой дает четырехугольник $ABMN$. Объемы пирамид $SABMN$ и $SABCD$ относятся как 5 : 9. Найдите косинус двугранного угла между боковой гранью и основанием исходной пирамиды.

2 вариант

1. Найдите все целые числа, которые лежат между числами $\sqrt{5} \cdot \sqrt{39}$ и $\frac{15-2,6}{2-1,2}$.

2. Решите уравнение $|x^2 - 15x + 56| = 15x - 52 - x^2$.

3. В 10 коробках с номерами от 1 до 10 лежат только красные и синие шары. Число красных шаров во второй коробке в $\frac{5}{4}$ раз больше, чем в первой. Количество красных шаров в коробках образуют арифметическую прогрессию, а количества синих шаров в коробках образуют геометрическую прогрессию (в порядке номеров коробок). Количество синих шаров в первой коробке составляет 20%, а в третьей — 40% от числа всех шаров в данной коробке. Найти отношение общего числа синих шаров к общему числу красных шаров.

4. Решите уравнение

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{1}{y^2} \cdot x^{\log_y x} = x, \\ (\log_2 x^3) \cdot \log_x (5x - 6y) = 9 \end{cases}$$

6. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ $\angle A = \angle D = 60^\circ$, $AD = 24$, $BC = 13$. Окружность с центром на стороне AD касается сторон AB , BC и CD . Найдите длины сторон AB и CD .

7. Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$11 + \cos^2 x > 3a^2 + 5a - (4a - 1) \sin x$$

выполняется для всех x .

8. В правильную четырехугольную пирамиду $SABCD$ (S — вершина пирамиды) вписан шар. Через центр шара и ребро AB проведена плоскость, которая в пересечении с пирамидой дает четырехугольник $ABMN$. Объемы пирамид $SABMN$ и $SABCD$ относятся как 7 : 25. Найдите косинус двугранного угла между боковой гранью и основанием исходной пирамиды.

2018 год

1 вариант

1. Какое целое число задано выражением $\frac{\sqrt{8} \cdot (\frac{5}{3} + \frac{1}{5})}{(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}) \cdot \sqrt{32}}$?

2. Решить уравнение:

$$\sqrt{10x + 6} = 5x - 9.$$

3. Решить неравенство:

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{x}} \leq \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{3-x}}.$$

4. В геометрической прогрессии 50 членов (все положительные). Если просуммировать логарифмы по основанию 2 от каждого члена прогрессии, то получится 1325. Если вычислить сумму логарифмов по основанию 2 только первых 30 членов, то получится 495. Вычислите сумму первых 10 членов прогрессии.

5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 5 \sin y - 3\sqrt{5} \cos x = 7 - 2 \cos^2 y, \\ \operatorname{tg} x = 2. \end{cases}$$

6. В треугольнике ABC со сторонами: $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 6$ проведены высоты AH_1 , BH_2 , CH_3 . Найдите отношение длин отрезков $H_1H_3 : H_2H_3$.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$|(2 - a)x - a| = (2 - a)(x + 1)^2 + 2ax - 2x + 2a$$

имеет ровно одно решение.

8. В треугольной пирамиде $SABC$ длины всех ребер одинаковы. Точка M в пространстве такова, что $MA = MB = MC = \sqrt{3}$ см и прямая AM пересекается с высотой треугольника SBC , опущенной из вершины B . Найдите объем пирамиды $SABC$.

2 вариант

1. Какое целое число задано выражением $\frac{\sqrt{48} \cdot (\frac{4}{3} - \frac{1}{7})}{(\frac{1}{3} + \frac{1}{7}) \cdot \sqrt{12}}$?

2. Решить уравнение:

$$\sqrt{14 - 5x} = 5x - 8.$$

3. Решить неравенство:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2-x}} \leq \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{3}{x}}.$$

4. В геометрической прогрессии 40 членов (все положительные). Если просуммировать логарифмы по основанию 2 от каждого члена прогрессии, то получится 900. Если вычислить сумму логарифмов по основанию 2 только первых 20 членов, то получится 250. Вычислите сумму первых 10 членов прогрессии.

5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3 \cos y - 4\sqrt{10} \cos x = 4 - 2 \sin^2 y, \\ \operatorname{tg} x = 3. \end{cases}$$

6. В треугольнике ABC со сторонами: $AB = 6$, $BC = 5$, $AC = 7$ проведены высоты AH_1 , BH_2 , CH_3 . Найдите отношение длин отрезков $H_1H_3 : H_2H_3$.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$|(1 - a)x - 2a| = (1 - a)(x + 2)^2 + 2ax + 4a + 2$$

имеет ровно одно решение.

8. В треугольной пирамиде $SABC$ длины всех ребер одинаковы. Точка M в пространстве такова, что $MA = MB = MC = 3$ см и прямая AM пересекается с высотой треугольника SBC , опущенной из вершины B . Найдите объем пирамиды $SABC$.

Решения**2011 год**

1 вариант

1. Какие из чисел $2, \frac{3}{4}, \sqrt{7} + 2, \sqrt{7} - 2$ являются корнями уравнения

$$4x^3 + 9 = 19x^2?$$

Решение:

Проверим соответствующие соотношения:

а) $4 \cdot 2^3 + 9 = 19 \cdot 2^2 \Leftrightarrow 41 = 76$ — неверно;

б) $4 \cdot \frac{3^3}{4^3} + 9 = 19 \cdot \frac{3^2}{4^2} \Leftrightarrow \frac{27}{16} + 9 = \frac{171}{16}$ — верно;

в) $4(\sqrt{7} + 2)^3 + 9 = 19(\sqrt{7} + 2)^2 \Leftrightarrow$
 $4(7\sqrt{7} + 42 + 12\sqrt{7} + 8) + 9 = 19(7 + 4\sqrt{7} + 4) \Leftrightarrow$
 $76\sqrt{7} + 209 = 209 + 76\sqrt{7}$ — верно;

г) $4(\sqrt{7} - 2)^3 + 9 = 19(\sqrt{7} - 2)^2 \Leftrightarrow$
 $4(7\sqrt{7} - 42 + 12\sqrt{7} - 8) + 9 = 19(7 - 4\sqrt{7} + 4) \Leftrightarrow$
 $76\sqrt{7} - 191 = 209 - 76\sqrt{7}$ — неверно.

Ответ: $\frac{3}{4}; \sqrt{7} + 2$.

2. Представьте число $\sqrt{33}$ в виде десятичной дроби с точностью до 0,1.

Решение:

Из неравенства $5^2 < 33 < 6^2$, понятно, что $5 < \sqrt{33} < 6$. Значит, целая часть равна 5. Обозначим первую цифру после запятой через x (x — целое число от 0 до 9). Тогда верно неравенство:

$$5 + 0.1x < \sqrt{33} < 5 + 0.1(x + 1) \Rightarrow$$

$$25 + x + 0.01x^2 < 33 < 25 + (x + 1) + 0.01(x + 1)^2 \Rightarrow$$

$$2500 + 100x + x^2 < 3300 < 2500 + 100(x + 1) + (x + 1)^2.$$

Получим 2 квадратных неравенства:

$$\begin{cases} x^2 + 100x - 800 < 0, \\ x^2 + 102x - 699 > 0. \end{cases}$$

Несложно проверить, что первому неравенству удовлетворяют все цифры x от 0 до 7, а второму — от 7 до 9. Значит, первая цифра после запятой — 7.

Ответ: 5,7.

3. Решите уравнение

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right) - \sin(\pi + 4x) = \sin 4x + \sin x.$$

Решение:

Применим формулы приведения:

$$\sin 2x + \sin 4x = \sin 4x + \sin x \Leftrightarrow \sin 2x - \sin x = 0.$$

Далее используем формулу синуса двойного угла:

$$\sin x(2 \cos x - 1) = 0.$$

Если обращается в ноль первый множитель, то $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.
Если второй — то $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: πn , $n \in \mathbb{Z}$; $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4^x \cdot 32^y = 256, \\ \sqrt{2x - 2} = y. \end{cases}$$

Решение:

Приведем в первом уравнении все множители к степени двойки:

$$2^{2x} \cdot 2^{5y} = 2^8.$$

Данное уравнение сводится к линейному $2x + 5y = 8$. А второе уравнение возведем в квадрат (с условием, что $y \geq 0$). Получим систему:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 8, \\ 2x - 2 = y^2, \\ y \geq 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + 5y - 6 = 0, \\ 2x = 2 + y^2, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Первое уравнение имеет решения $y = 1$ и $y = -6$. С учетом условия $y \geq 0$, оставим только $y = 1$ и соответствующий ему $x = \frac{3}{2}$.

Ответ: $(\frac{3}{2}; 1)$.

5. В арифметической прогрессии 34 члена, и разность этой прогрессии равна 12. Сумма всех членов прогрессии в 4 раза больше, чем сумма членов, стоящих на нечетных местах. Найдите первый член этой прогрессии.

Решение:

Сумма всех членов равна $S = \frac{a_1 + a_{34}}{2} \cdot 34$. Выражая a_{34} через первый член и разность прогрессии $a_{34} = a_1 + 33d = a_1 + 33 \cdot 12$, получим:

$$S = 34(a_1 + 33 \cdot 6).$$

Заметим, что члены, стоящие на нечетных местах, тоже образуют арифметическую прогрессию. Причем количество таких членов равно 17 (первый член a_1 , последний — a_{33}), а разность $f = 24$. Соответственно, сумму членов, стоящих на нечетных местах, тоже можно посчитать как сумму арифметической прогрессии: $T = \frac{a_1 + a_{33}}{2} \cdot 17$. Выражая a_{33} через первый член и разность прогрессии $a_{33} = a_1 + 32d = a_1 + 32 \cdot 12$, получим:

$$T = 17(a_1 + 32 \cdot 6).$$

Из условия известно, что S в 4 раза больше, чем T , легко найти a_1 :

$$\begin{aligned} 34(a_1 + 33 \cdot 6) &= 4 \cdot 17(a_1 + 32 \cdot 6) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a_1 + 33 \cdot 6 &= 2a_1 + 64 \cdot 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a_1 &= 6(33 - 64) = -186 \end{aligned}$$

Ответ: -186 .

6. В трапеции, описанной около окружности радиуса 4, разность длин боковых сторон равна 4, а длина средней линии равна 12. Найдите длины сторон трапеции.

Решение:

Обозначим: A, B, C, D — вершины трапеции; $BC = a, AD = b$ — длины оснований трапеции; $CD = f, AB = e$ — боковые стороны трапеции ($e > f$). Так как около трапеции можно описать окружность, то $a + b = e + f$. Получаем систему:

$$\begin{cases} a + b = e + f, \\ f - e = 4, \\ \frac{a+b}{2} = 12. \end{cases}$$

Из первого и последнего уравнения легко получить, что $e + f = 24$. А с учетом второго соотношения $f - e = 4$, находим ответ $f = 14, e = 10$.




Рис. 1: к задаче №6 (1 случай)

Чтобы найти боковые стороны, сделаем стандартное дополнительное построение: опустим высоты BH и CG . Так как диаметр вписанной окружности EF равен высоте трапеции, то известно, что $BH = CG = EF = 8$. По теореме Пифагора найдем AH и DG :

$$AH^2 = AB^2 - BH^2 = 10^2 - 8^2 = 36 \Leftrightarrow AH = 6,$$

$$GD^2 = CD^2 - CG^2 = 14^2 - 8^2 = 132 \Leftrightarrow GD = 2\sqrt{33}.$$

Так как $BCGH$ — прямоугольник, то $GH = BC = a$. Обратим внимание на два принципиальных случая расположения точек A, H, G и D на прямой: $A-H-G-D$ и $H-A-G-D$ (стоит отметить, что остальные варианты соответствуют одному из данных двух).

В первом случае $AH + a + GD = b$. Получаем систему:

$$\begin{cases} a + b = 24, \\ b - a = 2\sqrt{33} + 6. \end{cases}$$

Откуда легко найти $a = 9 - \sqrt{33}$ и $b = 15 + \sqrt{33}$.




Рис. 2: к задаче №6 (2 случая)

Во втором случае $HA + b = a + GD$. Получаем систему:

$$\begin{cases} a + b = 24, \\ b - a = 2\sqrt{33} - 6. \end{cases}$$

Откуда легко найти $a = 15 - \sqrt{33}$ и $b = 9 + \sqrt{33}$.

Ответ: 10; $9 - \sqrt{33}$; 14; $15 + \sqrt{33}$ или 10; $15 - \sqrt{33}$; 14; $9 + \sqrt{33}$.

7. Решите неравенство

$$\frac{\log_2(x+6) \cdot \log_5(x+5)}{x+4} \leq \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{x+3}.$$

Решение:

Предварительно отметим несложное свойство логарифмов при допустимых значениях a , b , c и d :

$$\log_a b \cdot \log_c d = \log_a d \cdot \log_c b.$$

Для доказательства этого свойства достаточно переписать каждый логарифм как отношение двух логарифмов по одному и тому

же основанию (например, по основанию e):

$$\frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln d}{\ln c} = \frac{\ln d}{\ln a} \cdot \frac{\ln b}{\ln c}.$$

Преобразуем левую часть неравенства:

$$\begin{aligned} \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{x+4} &\leq \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{x+3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5) \cdot \left(\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+3} \right) &\leq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{(x+4)(x+3)} &\geq 0. \end{aligned}$$

Неравенство решим методом интервалов, предварительно для каждого из трех сомножителей (знаменатель — один сомножитель) обозначив области, в которых они неотрицательны.

$$\log_5(x+6) \geq 0 \Leftrightarrow x+6 \geq 1 \Leftrightarrow x \in [-5, +\infty),$$

$$\log_2(x+5) \geq 0 \Leftrightarrow x+5 \geq 1 \Leftrightarrow x \in [-4, +\infty),$$

$$(x+4)(x+3) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -4) \cup (-3, +\infty).$$

	$(-5, -4)$	$(-4, -3)$	$(-3, +\infty)$
$\log_5(x+6)$	+	+	+
$\log_2(x+5)$	-	+	+
$(x+4)(x+3)$	+	-	+
L	-	-	+

С учетом области определения $x \in (-5, -4) \cup (-4, -3) \cup (-3, +\infty)$ можно выделить интервалы знакопостоянства выражения

$$L = \frac{\log_5(x+6) \cdot \log_2(x+5)}{(x+4)(x+3)}.$$

Отметим, что точки, в которых числитель обнуляется, не принадлежат области допустимых значений.

Ответ: $(-3; +\infty)$.

8. В пирамиде $ABCD$: $AB = 1$, $AC = 2$, $AD = 3$, $BC = \sqrt{5}$, $BD = \sqrt{10}$, $CD = \sqrt{13}$. Найдите радиус шара, вписанного в пирамиду $ABCD$.

Решение:

Радиус вписанного шара найдем с помощью формулы объема пирамиды:

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3}R \cdot S,$$

где S — площадь полной поверхности. Вычислим объем и площадь пирамиды.

Найдем объем V_{ABCD} . Заметим, что все плоские углы BAC , CAD , DAB с вершиной в точке A — прямые. Для этого достаточно проверить выполнение теоремы Пифагора для треугольников CAB ($\sqrt{5}^2 = 1^2 + 2^2$), BAD ($\sqrt{10}^2 = 1^2 + 3^2$) и DAC ($\sqrt{13}^2 = 2^2 + 3^2$). Так как все углы при вершине A — прямые, то DA является высотой, опущенной из вершины D на плоскость ABC , которая является прямоугольным треугольником. Значит,

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3}AD \cdot S_{ABC} = \frac{1}{6}AD \cdot AB \cdot AC = 1.$$

Найдем площадь полной поверхности $S = S_{ABC} + S_{ADC} + S_{ABD} + S_{BCD}$. Первые три треугольника прямоугольные и их площади, соответственно, равны:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}BA \cdot AC = 1,$$

$$S_{ADC} = \frac{1}{2}DA \cdot AC = 3,$$

$$S_{ABD} = \frac{1}{2}BA \cdot AD = \frac{3}{2}.$$

Последний треугольник имеет стороны $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{13}$. Найти площадь треугольника со сторонами в виде радикалов можно двумя способами: либо с использованием теоремы Пифагора для двух треугольников, образованных одной из высот, либо с помощью развернутой формулы Герона, которая зависит только от квадратов сторон:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{4}\sqrt{2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) - a^4 - b^4 - c^4}.$$

Подставим квадраты сторон:

$$S_{BCD} = \frac{1}{4}\sqrt{2(5 \cdot 10 + 10 \cdot 13 + 13 \cdot 5) - 5^2 - 10^2 - 13^2} = \frac{1}{4}\sqrt{196} = \frac{7}{2}.$$

Площадь полной поверхности: $S = 1 + 3 + \frac{3}{2} + \frac{7}{2} = 9$. Радиус вписанной сферы: $R = \frac{3V_{ABCD}}{S} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Ответ: $\frac{1}{3}$.

2012 год

1 вариант

1. Определите, какие из чисел являются целыми, и вычислите эти целые числа:

а) $\frac{19}{7} + \frac{7}{5} - \frac{4}{35}$;

б) $\sqrt{22} \cdot \sqrt{33} \cdot \sqrt{6}$;

в) $\frac{2,9 \cdot 3,4}{4,93}$.

Решение:

Вычислим значения данных выражений:

а) $\frac{19}{7} + \frac{7}{5} - \frac{4}{35} = \frac{95 + 49 - 4}{35} = \frac{140}{35} = 4$ — целое;

б) $\sqrt{22} \cdot \sqrt{33} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{2 \cdot 11 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 3} = 2 \cdot 3 \cdot 11 = 66$ — целое;

в) $\frac{2,9 \cdot 3,4}{4,93} = \frac{29 \cdot 34}{493} = 2$ — целое.

Ответ: все три числа являются целыми: 4, 66, 2.

2. Решите уравнение

$$\sqrt{x^2 + 24} = 6 - x^2.$$

Решение:

Возведем обе части уравнения в квадрат (с условием неотрицательности правой части):

$$\sqrt{x^2 + 24} = 6 - x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + 24} = (6 - x^2)^2, \\ 6 - x^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - 13x^2 + 12 = 0, \\ x^2 \leq 6. \end{cases}$$

Сделаем стандартную для биквадратного уравнения замену $t = x^2$:

$$\begin{cases} t^2 - 13t + 12 = 0, \\ t \leq 6. \end{cases}$$

Первое уравнение имеет корни 1 и 12. Учитывая второе неравенство, получаем $t = 1$. Вернемся к исходной переменной: $x^2 = 1$ и получим ответ $x = \pm 1$.

Ответ: $-1; 1$.

3. Решите уравнение

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 |\cos x + \sin x| = \frac{\pi^2}{4} (\cos x + \sin x).$$

Решение:

Раскроем модуль $|\cos x + \sin x|$.

а) $\cos x + \sin x = 0$. В этом случае уравнение эквивалентно верному тождеству $0 = 0$. Найдем все x , которые удовлетворяют условию а):

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

б) $\cos x + \sin x > 0$. Сократим на $\cos x + \sin x > 0$:

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}.$$

Находим корни данного квадратного уравнения: 0 и π . Условию б) удовлетворяет только первый корень. Значит, $x = 0$.

в) $\cos x + \sin x < 0$. Сократим на $\cos x + \sin x < 0$:

$$\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 = -\frac{\pi^2}{4}.$$

Полученное уравнения не имеет корней.

Ответ: $\{0; \frac{3\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$.

4. В арифметической прогрессии десятый член больше пятого члена на 15 и больше второго члена в 13 раз. Найдите сумму всех членов этой прогрессии, начиная с сотого члена и заканчивая двухсотым.

Решение:

Используем стандартные обозначения для членов арифметической прогрессии: a_n — n -й член прогрессии, d — разность прогрессии:

$$\begin{cases} a_{10} = a_5 + 15, \\ a_{10} = 13a_2 \end{cases}$$

С учетом формулы $a_n = a_1 + (n - 1)d$ найдем первый член и разность прогрессии:

$$\begin{cases} a_1 + 9d = a_1 + 4d + 15, \\ a_1 + 9d = 13a_1 + 13d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 3, \\ a_1 = -1. \end{cases}$$

Чтобы найти сумму членов прогрессии с сотого до двухсотого, просуммируем 101 подряд идущий член арифметической прогрессии:

$$S = a_{100} + a_{101} + \dots + a_{200} = \frac{a_{100} + a_{200}}{2} \cdot 101.$$

Найдем необходимые члены прогрессии:

$$a_{100} = a_1 + 99d = -1 + 99 \cdot 3 = 296,$$

$$a_{200} = a_1 + 199d = -1 + 199 \cdot 3 = 596.$$

Получим ответ: $S = \frac{296+596}{2} \cdot 101 = 45046$.

Ответ: 45046.

5. Решите неравенство

$$\log_7 x \leq 5 + 2 \log_{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{7} \right).$$

Решение:

Приведем логарифм справа к основанию 7:

$$\log_{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{7} \right) = \log_{x^{1/2}} 7^{-1} = -2 \log_x 7 = -\frac{2}{\log_7 x}.$$

Сделаем замену переменной $t = \log_7 x$:

$$t \leq 5 - \frac{4}{t} \Leftrightarrow \frac{t^2 - 5t + 4}{t} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(t-1)(t-4)}{t} \leq 0.$$

Решим методом интервалов: $t \in (-\infty, 0) \cup [1, 4]$. Для возврата к искомой переменной x , перепишем в виде неравенств:

$$\begin{cases} t < 0, \\ \begin{cases} t \geq 1, \\ t \leq 4 \end{cases} \end{cases}$$

Вернемся к исходной переменной:

$$\begin{cases} \log_7 x < 0, \\ \begin{cases} \log_7 x \geq 1, \\ \log_7 x \leq 4 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x > 0, \\ x < 1, \end{cases} \\ \begin{cases} x \geq 7, \\ x \leq 7^4. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $(0; 1) \cup [7; 2401]$.

6. В выпуклом шестиугольнике все углы равны 120° и четыре последовательные стороны имеют длины 2, 3, 3, 4. Найдите площадь шестиугольника.

Решение:




Рис. 3: к задаче №6

Обозначим вершины 6-угольника через A, B, C, D, E и F . Причем $AB = 2$, $BC = CD = 3$, $DE = 4$. Продолжим прямые AB и CD до пересечения в точке K и прямые AF и DE до пересечения в точке L .

Треугольник BCK — равносторонний, так как $\angle CBK = \angle BCK = 60^\circ$. Значит, $BK = CK = CB = 3$. Аналогично, треугольник LFE тоже равносторонний, $LF = FE = EL$.

Так как $\angle A = \angle D = 120^\circ$ и $\angle K = \angle L = 60^\circ$, то $AK \parallel DL$ и $AL \parallel KD$, то есть $AKDL$ — параллелограмм. Найдём сторону параллелограмма $LD = AK = AB + BK = 2 + 3 = 5$. Откуда $EF = FL = LE = LD - ED = 5 - 4 = 1$.

Из построения ясно, что площадь шестиугольника $ABCDEF$ равна площади параллелограмма $AKDL$ за вычетом суммы площадей равносторонних треугольников BCK и FEL :

$$S_{ABCDEF} = S_{AKDL} - S_{BCK} - S_{FEL}.$$

Вычислим площадь параллелограмма

$$S_{AKDL} = LD \cdot DK \cdot \sin \angle LDK = 5 \cdot 6 \cdot \sin 120^\circ = 15\sqrt{3}$$

и площади треугольников

$$S_{BCK} = BC^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{4},$$

$$S_{FEL} = FE^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Площадь шестиугольника $S_{ABCDEF} = \frac{25\sqrt{3}}{2}$.

Ответ: $\frac{25\sqrt{3}}{2}$.

7. Найдите все значения, которые принимает функция

$$f(x) = \frac{2x^2 + x + 1}{3x^2 - x + 1}.$$

Решение:

Найдем все значения параметра a такие, что уравнение

$$\frac{2x^2 + x + 1}{3x^2 - x + 1} = a$$

имеет по крайней мере одно решение.

Заметим, что знаменатель $3x^2 - x + 1$ — это квадратный трехчлен с отрицательным дискриминантом $D = -11 < 0$. Значит, знаменатель никогда не обращается в нуль, и уравнение эквивалентно следующему:

$$(2 - 3a)x^2 + (1 + a)x + (1 - a) = 0.$$

Рассмотрим два случая:

- а) $2 - 3a = 0$. Уравнение будет линейным. Значит, при $a = \frac{2}{3}$, решение существует: $x = -\frac{1}{5}$.
- б) $2 - 3a \neq 0$. Уравнение будет квадратным. Значит, при $a \neq \frac{2}{3}$, решение существует тогда, и только тогда, когда дискриминант неотрицателен:

$$(1 + a)^2 - 4(2 - 3a)(1 - a) \geq 0 \Leftrightarrow 11a^2 - 22a + 7 \leq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 1 - 2\frac{\sqrt{11}}{11} \leq a \leq 1 + 2\frac{\sqrt{11}}{11}.$$

Несложно проверить, что число $\frac{2}{3}$ лежит в указанном множестве на отрезке. Тогда с учетом условия б) во втором случае ответом будет:

$$a \in \left[1 - 2\frac{\sqrt{11}}{11}, \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; 1 + 2\frac{\sqrt{11}}{11}\right].$$

Объединим ответы из двух случаев: $a \in \left[1 - 2\frac{\sqrt{11}}{11}, 1 + 2\frac{\sqrt{11}}{11}\right]$.

Ответ: $\left[1 - 2\frac{\sqrt{11}}{11}; 1 + 2\frac{\sqrt{11}}{11}\right]$.

8. Кусок сыра в форме правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ (S — вершина пирамиды) разрезали одним плоским разрезом, который проходит через ребро AB и делит ребро SC в отношении $1 : 3$, считая от вершины S . Найдите отношение объемов полученных кусков сыра.

Решение:

Обозначим: K — точка, которая делит SC в отношении $1 : 3$, считая от вершины S ; L — точка пересечения плоскости ABK и ребра SD . Докажем, что сечение, проходящее через точку K и ребро AB — это равнобедренная трапеция $ABKL$.




Рис. 4: к задаче №8

Четырехугольник $KLDC$ — плоский. Значит, либо прямые KL , CD и AB пересекаются в одной точке, либо — параллельны. Первый вариант невозможен, так как в правильной пирамиде AB параллельно CD . Значит, KL параллельно CD и $ABKL$ — трапеция. Так как треугольники ALD и BKC равны, то сечение $ABKL$ — равнобедренная трапеция.

Введем обозначения: M — середина отрезка AB , N — середина отрезка CD , P — середина отрезка KL , O — центр квадрата $ABCD$. Понятно, что точки P и O будут лежать в плоскости SMN , а плоскости SMN и $ABKL$ будут перпендикулярны (в силу симметрии пирамиды относительно плоскости SMN). Значит, перпендикуляр SH из S на плоскость $ABKL$ тоже будет лежать в плоскости SMN .

Запишем отношение объемов пирамид $SABCD$ и $SABKL$:

$$\frac{V_{SABKL}}{V_{SABCD}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot S_{ABKL} \cdot SH}{\frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SO} = \frac{S_{ABKL}}{S_{ABCD}} \cdot \frac{SH}{SO}$$

Отметим, что $ABKL$ — равнобедренная трапеция с высотой MP и площадью $S_{ABKL} = \frac{AB+KL}{2} \cdot MP$, а $ABCD$ — квадрат с площадью $S_{ABCD} = AB \cdot MN$.

Перепишем отношение объемов:

$$\frac{V_{SABKL}}{V_{SABCD}} = \frac{\frac{1}{2}(AB + KL) \cdot MP \cdot SH}{AB \cdot MN \cdot SO} = \frac{AB + KL}{2AB} \cdot \frac{MP \cdot SH}{MN \cdot SO}.$$




Рис. 5: к задаче №8

С учетом того, что

$$MP \cdot SH = 2S_{SMP} = SP \cdot SM \cdot \sin \angle NSM,$$

$$MN \cdot SO = 2S_{SMN} = SN \cdot SM \cdot \sin \angle NSM,$$

получаем соотношение

$$\frac{V_{SABKL}}{V_{SABCD}} = \frac{AB + KL}{2AB} \cdot \frac{SP}{SN}$$

Обозначим длину стороны основания пирамиды через a . Легко заметить, что треугольники SKL и SCD подобны с коэффициентом подобия $1 : 4$. Значит, $KL = \frac{a}{4}$ и $\frac{SP}{SN} = \frac{1}{4}$.

$$\frac{V_{SABKL}}{V_{SABCD}} = \frac{a + \frac{a}{4}}{2a} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{32}$$

Откуда легко найти отношение, в котором делится объем:

$$\frac{V_{ABLKDC}}{V_{SABKL}} = \frac{27}{5}.$$

Ответ: $27 : 5$.

2013 год

1 вариант

1. Докажите, что число

$$\left(\sqrt[3]{9} - \sqrt[6]{3}\right)^3 \cdot \left(9 + 5\sqrt{3}\right)$$

является целым и найдите это целое число.

Решение:

Упростим выражение с помощью формулы куба разности:

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt[3]{9} - \sqrt[6]{3}\right)^3 \cdot \left(9 + 5\sqrt{3}\right) = \\ & = \left(9 - 3\sqrt[3]{9^2}\sqrt[6]{3} + 3\sqrt[3]{9}\sqrt[6]{3^2} - \sqrt{3}\right) \left(9 + 5\sqrt{3}\right) = \\ & = \left(9 - 3 \cdot 3^{\frac{3}{2}} + 3 \cdot 3 - \sqrt{3}\right) \left(9 + 5\sqrt{3}\right) = 2 \left(9 - 5\sqrt{3}\right) \left(9 + 5\sqrt{3}\right) = \\ & = 2 \cdot (81 - 75) = 12. \end{aligned}$$

Ответ: 12.

2. Решите неравенство

$$\frac{13 \cdot |x + 2| - 5}{2 \cdot |x + 2| + 1} < 4.$$

Решение:

Замена $t = |x + 2| \geq 0$.

$$\frac{13t - 5}{2t + 1} < 4 \Leftrightarrow \frac{5t - 9}{2t + 1} < 0.$$

Решаем методом интервалов и получаем решение $t \in (-\frac{1}{2}; \frac{9}{5})$. С учетом допустимых значений t получим, что:

$$0 \leq t < \frac{9}{5} \Leftrightarrow |x + 2| < \frac{9}{5} \Leftrightarrow -\frac{9}{5} < x + 2 < \frac{9}{5} \Leftrightarrow -\frac{19}{5} < x < -\frac{1}{5}.$$

Ответ: $(-3\frac{4}{5}; -\frac{1}{5})$.

3. Решите уравнение

$$2 + \cos(\pi + 9x) = 5 \sin \frac{\pi - 9x}{2}.$$

Решение:

Используя формулы приведения, приведем уравнение к следующему виду:

$$2 - \cos 9x = 5 \cos \frac{9x}{2}.$$

Применим формулу понижения степени:

$$3 - 2 \cos^2 \frac{9x}{2} = 5 \cos \frac{9x}{2}.$$

После замены $t = \cos \frac{9x}{2} \in [-1; 1]$ получим квадратное уравнение

$$2t^2 + 5t - 3 = 0.$$

Из двух корней $t = -3$ и $t = \frac{1}{2}$ первый является посторонним. Значит:

$$\cos \frac{9x}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{9x}{2} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{27} + \frac{4\pi n}{9}, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\pm \frac{2\pi}{27} + \frac{4\pi n}{9}, n \in \mathbb{Z}$.

4. В возрастающей арифметической прогрессии произведение седьмого и восьмого членов на 46 больше, чем произведение пятого и девятого членов, и на 108 больше, чем произведение третьего и десятого членов. Чему равна сумма первых 25 членов этой прогрессии?

Решение:

Перепишем условие задачи в стандартных обозначениях арифметической прогрессии:

$$\begin{cases} a_7 \cdot a_8 = 46 + a_5 \cdot a_9, \\ a_7 \cdot a_8 = 108 + a_3 \cdot a_{10} \end{cases}$$

Выражая все члены прогрессии через разность прогрессии и первый член, получим систему:

$$\begin{cases} (a_1 + 6d)(a_1 + 7d) = 46 + (a_1 + 4d)(a_1 + 8d), \\ (a_1 + 6d)(a_1 + 7d) = 108 + (a_1 + 2d)(a_1 + 9d) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 d + 10d^2 = 46, \\ 2a_1 d + 24d^2 = 108. \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения удвоенное первое, получим $d^2 = 4$. С учетом того, что прогрессия возрастающая, получим $d = 2$ и, соответственно, $a_1 = 3$. Найдём $a_{25} = a_1 + 24d = 51$ и сумму первых 25 членов:

$$S_{25} = \frac{a_1 + a_{25}}{2} \cdot 25 = \frac{3 + 51}{2} \cdot 25 = 675.$$

Ответ: 675.

5. Решите неравенство

$$(18 - 3x) \cdot \log_{2x-12} \sqrt[3]{2} \leq 1.$$

Решение:

Используя свойства логарифмов, перейдем к эквивалентному неравенству:

$$\log_{2^x-12} 2^{6-x} \leq 1.$$

- а) $2^x - 12 > 1$ — знак неравенства сохраняется при снятии логарифма. Получим систему неравенств:

$$\begin{cases} 2^x - 12 > 1, \\ 2^{6-x} \leq 2^x - 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x > 13, \\ \frac{2^{2x-12} \cdot 2^x - 64}{2^x} \geq 0. \end{cases}$$

Производя замену $t = 2^x > 0$, получим систему:

$$\begin{cases} t > 13, \\ \frac{(t-16)(t+4)}{t} \geq 0, \end{cases}$$

решение которой находится методом интервалов: $t \geq 16$. Возвращаясь к исходной переменной, получим: $x \geq 4$.

- б) $0 < 2^x - 12 < 1$ — знак неравенства меняется на противоположный при снятии логарифма. Получим систему неравенств:

$$\begin{cases} 0 < 2^x - 12 < 1, \\ 2^{6-x} \geq 2^x - 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12 < 2^x < 13, \\ \frac{2^{2x-12} \cdot 2^x - 64}{2^x} \leq 0. \end{cases}$$

Снова производя замену $t = 2^x > 0$, получим систему:

$$\begin{cases} 12 < t < 13, \\ \frac{(t-16)(t+4)}{t} \leq 0, \end{cases}$$

решение которой находится методом интервалов: $12 < t < 13$. Возвращаясь к исходной переменной, получим ответ во втором случае: $\log_2 12 < x < \log_2 13$.

Ответ: $(\log_2 12; \log_2 13) \cup [4; +\infty)$.

6. В трапеции $ABCD$ длина основания AD равна 20, а длина боковой стороны CD равна $10\sqrt{3}$. Через точки A, B, C проходит окружность, пересекающая основание трапеции AD в точке F . Угол AFB равен 60° . Найдите длину отрезка BF .

Решение:




Рис. 6: к задаче №6

Трапеция $ABCF$ — вписанная. Следовательно, она равнобедренная: $BF = CA$ и $\angle AFB = \angle CAF = 60^\circ$. По теореме синусов для треугольника ACD :

$$\frac{CD}{\sin \angle CAF} = \frac{AD}{\sin \angle ACD} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin \angle ACD = \frac{AD}{CD} \cdot \sin \angle CAF = \frac{20}{10\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.$$

Значит, угол ACD — прямой. Найдём AC по теореме Пифагора для треугольника ACD :

$$AC^2 = AD^2 - CD^2 = 20^2 - (10\sqrt{3})^2 = 100.$$

Откуда легко получить $BF = AC = 10$.

Ответ: 10.

7. Произведение двух натуральных чисел уменьшили на 26. Результат разделили на сумму исходных натуральных чисел с остатком. В частном получили 5, а в остатке 60. Найдите исходные натуральные числа.

Решение:

Запишем по определению деление с остатком:

$$a \cdot b - 26 = (a + b) \cdot 5 + 60, \text{ где } 60 < a + b.$$

Разложим полученное уравнение на линейные множители:

$$ab - 5(a + b) = 86 \Leftrightarrow (a - 5)(b - 5) = 111.$$

Справа стоит положительное число, значит слева произведение либо двух отрицательных, либо двух положительных чисел. В первом случае $a < 5$ и $b < 5$. Тогда их сумма не может быть больше 60. Значит $(a-5)$ и $(b-5)$ — это два натуральных делителя 111, которые в произведении дают 111. Варианты разложения:

$$111 = 1 \cdot 111 = 3 \cdot 37 = 37 \cdot 3 = 111 \cdot 1.$$

Из описанных вариантов условию $a + b > 60$ удовлетворяют только первый и последний, откуда легко найти ответы.

Ответ: (116; 6); (6; 116).

8. Квадрат $ABCD$ со стороной 3 см является основанием двух пирамид $MABCD$ и $NABCD$, причем MA и NC — высоты этих пирамид и точки M, N лежат по одну сторону от плоскости $ABCD$. Сумма длин высот MA и NC равна 9 см, а объем общей части пирамид равен 6 см^3 . Найдите отношение высот MA и NC .

Решение:




Рис. 7: к задаче №8

Пересечением пирамид $MABCD$ и $NABCD$ является тоже пирамида. Введем обозначения: O — точка пересечения отрезков MC и AN (вершина полученной пирамиды); H — основание перпендикуляра, опущенного из точки O на плоскость $ABCD$.

Найдем высоту OH :

$$V_{ABCD O} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot OH \Leftrightarrow 6 = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot OH \Leftrightarrow OH = 2.$$




Рис. 8: к задаче №8

Найдем высоты AM и CN . Обозначим $AM = x$, $HC = y$. Тогда $NC = 9 - x$ и $AH = 3\sqrt{2} - y$. Две пары треугольников MAC , OHC и NCA , OHA подобны:

$$\frac{MA}{OH} = \frac{AC}{HC},$$

$$\frac{NC}{OH} = \frac{CA}{HA}.$$

Из данных соотношений получим систему уравнений с двумя неизвестными x и y :

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{y}, \\ \frac{9-x}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}-y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 6\sqrt{2}, \\ (9-x)(3\sqrt{2}-y) = 6\sqrt{2}, \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} xy = 6\sqrt{2}, \\ 27\sqrt{2} - 3\sqrt{2}x - 9y + xy = 6\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 6\sqrt{2}, \\ y = 3\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{3}x \end{cases}$$

Подставим y в первое уравнение и получим квадратное уравнение

$$x^2 - 9x + 18 = 0,$$

которое имеет корни 6 и 3. Соответственно, искомое отношение $\frac{MA}{NC}$ будет равно либо $\frac{1}{2}$, либо 2.

Ответ: $\{\frac{1}{2}; 2\}$.

2014 год

1 вариант

1. К какому целому числу находится ближе всего на числовой оси число

$$\frac{5,1 \cdot 4,2 + 11,76}{2,3 \cdot 2,2 - 2,46}?$$

Решение:

Имеем:

$$5,1 \cdot 4,2 + 11,76 = 21,42 + 11,76 = 33,18,$$

$$2,3 \cdot 2,2 - 2,46 = 5,06 - 2,46 = 2,6.$$

Следовательно,

$$\frac{5,1 \cdot 4,2 + 11,76}{2,3 \cdot 2,2 - 2,46} = 12,7\dots$$

Ясно, что ближайшим целым числом к полученному числу будет 13.

Ответ: 13.

2. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt{41 - 6x - x^2}}{3 - x} = 1.$$

Решение:

Уравнение равносильно следующей системе:

$$\begin{cases} \sqrt{41 - 6x - x^2} = 3 - x, \\ 3 - x \neq 0, \end{cases}$$

которая, в свою очередь преобразуется к виду:

$$\begin{cases} 41 - 6x - x^2 = (3 - x)^2, \\ 3 - x > 0. \end{cases}$$

Первое уравнение полученной системы сводится к квадратному уравнению $x^2 - 16 = 0$ с корнями $x = \pm 4$. Неравенству в системе удовлетворяет лишь меньший корень.

Ответ: -4 .

3. Решите уравнение

$$6 \sin^2 3x + 2 \cos^2 6x = 5.$$

Решение:

Применяя к первому слагаемому формулу понижения степени, получим уравнение, равносильное исходному:

$$3 - 3 \cos 6x + 2 \cos^2 6x = 5.$$

Замена $t = \cos 6x \in [-1, 1]$ преобразует уравнение к квадратному

$$2t^2 - 3t - 2 = 0$$

с корнями $-\frac{1}{2}$ и 2 . Очевидно, что второй корень не подходит. Получаем:

$$\cos 6x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$.

4. Даны арифметическая прогрессия, в которой разность отлична от 0, и геометрическая прогрессия. Известно, что 1-й, 2-й и 10-й члены арифметической прогрессии совпадают, соответственно, со 2-м, 5-м и 8-м членами геометрической прогрессии. Найдите отношение суммы 8 первых членов геометрической прогрессии к сумме 8 первых членов арифметической прогрессии.

Решение:

Оставаясь в рамках стандартных обозначений, мы можем переписать условие задачи в виде системы:

$$\begin{cases} a_1 = b_2, \\ a_2 = b_5, \\ a_{10} = b_8, \\ d \neq 0. \end{cases}$$

Используя соотношение $b_5^2 = b_2 b_8$, выполняющееся для любой геометрической прогрессии, мы получаем следующее соотношение для данной арифметической прогрессии:

$$a_1(a_1 + 9d) = (a_1 + d)^2.$$

Раскрывая скобки и учитывая неравенство $d \neq 0$, имеем: $d = 7a_1$. Следовательно:

$$q^3 = \frac{b_5}{b_2} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8a_1}{a_1} = 8,$$

то есть $q = 2$.

Выпишем выражения для суммы первых 8 членов арифметической и геометрической прогрессий, соответственно:

$$S_8^A = \frac{a_1 + a_8}{2} \cdot 8 = \frac{2a_1 + 7d}{2} \cdot 8 = \frac{51a_1}{2} \cdot 8 = 204a_1,$$

$$S_8^G = b_1 \frac{q^8 - 1}{q - 1} = \frac{b_2}{q} \cdot \frac{q^8 - 1}{q - 1} = \frac{255}{2} a_1.$$

Отсюда находим ответ на задачу:

$$\frac{S_8^\Gamma}{S_8^A} = \frac{255a_1}{2} \cdot \frac{1}{204a_1} = \frac{5}{8}.$$

Ответ: $\frac{5}{8}$.

5. Решите неравенство

$$\log_{x^2} \left(5x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right)^2 \leq 2.$$

Решение:

Область допустимых значений:

$$\begin{cases} 15x^2 - 20x - 32 \neq 0, \\ x^2 > 0, \\ x^2 \neq 1, \end{cases}$$

То есть $x \neq \frac{10 \pm 2\sqrt{145}}{15}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$. Запишем правую часть неравенства в виде логарифма:

$$\log_{x^2} \left(5x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right)^2 \leq \log_{x^2} x^4.$$

Рассмотрим два случая:

а) $x^2 > 1$. Тогда неравенство преобразуется к виду

$$\left(5x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right)^2 \leq x^4.$$

Перенесем правую часть влево и распишем разность квадратов:

$$\left(4x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right) \left(6x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right) \leq 0.$$

Последнее неравенство после разложения квадратных трехчленов на множители равносильно следующему:

$$24 \left(x - \frac{8}{3} \right) (x + 1)(x - 2) \left(x + \frac{8}{9} \right) \leq 0.$$

Решим методом интервалов:

$$x \in \left[-1; -\frac{8}{9} \right] \cup \left[2; \frac{8}{3} \right].$$

С учетом ограничений $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ и области допустимых значений (учтем, что число $\frac{10+2\sqrt{145}}{15}$ лежит в интервале $\left[2, \frac{8}{3} \right]$), получим ответ в случае а):

$$x \in \left[2; \frac{10 + 2\sqrt{145}}{15} \right) \cup \left(\frac{10 + 2\sqrt{145}}{15}; \frac{8}{3} \right].$$

б) $0 < x^2 < 1$. Тогда неравенство преобразуется к виду

$$\left(5x^2 - \frac{20}{3}x - \frac{32}{3} \right)^2 \geq x^4,$$

которое эквивалентно

$$24 \left(x - \frac{8}{3} \right) (x + 1)(x - 2) \left(x + \frac{8}{9} \right) \geq 0.$$

Решим методом интервалов:

$$x \in (-\infty; -1] \cup \left[-\frac{8}{9}; 2 \right] \cup \left[\frac{8}{3}; +\infty \right).$$

С учетом ограничений $x \in (-1; 0) \cup (0; 1)$ и области допустимых значений (учтем, что число $\frac{10-2\sqrt{145}}{15}$ не лежит в интервале $\left[-\frac{8}{9}; 0 \right]$), получим ответ в случае б):

$$x \in \left[-\frac{8}{9}; 0 \right) \cup (0; 1).$$

Ответ: $[-\frac{8}{9}; 0) \cup (0; 1) \cup [2; \frac{10+2\sqrt{145}}{15}) \cup (\frac{10+2\sqrt{145}}{15}; 2\frac{2}{3}]$.

6. Высота AH и биссектриса BL в треугольнике ABC пересекаются в точке K . При этом $AK = 4$, $KH = 2$, $BL = 11$. Найдите длину стороны BC .

Решение:




Рис. 9: к задаче №6

Ясно, что угол $\angle ABC$ и угол $\angle ACB$ — острые, иначе биссектриса не пересекала бы высоту, находящуюся вне треугольника. Согласно свойству биссектрисы внутреннего угла имеем:

$$\cos \angle ABH = \frac{BH}{AB} = \frac{KH}{AK} = \frac{1}{2},$$

откуда $\angle ABH = 60^\circ$. Следовательно, $\angle ABC = 60^\circ$.

Из прямоугольного треугольника ABH , находим $AB = \frac{AH}{\sin 60^\circ} = 4\sqrt{3}$.

Подставим в формулу длины биссектрисы

$$l_b = \frac{2ac \cos \frac{\beta}{2}}{a + c}$$

все известные параметры

$$11 = \frac{2 \cdot 4\sqrt{3} \cdot BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{4\sqrt{3} + BC} = \frac{12 \cdot BC}{4\sqrt{3} + BC}$$

Откуда легко найти $BC = 44\sqrt{3}$.

Ответ: $44\sqrt{3}$.

7. Найдите все значения a , при которых уравнение

$$a(x^2 + x^{-2}) - (a + 1)(x + x^{-1}) + 5 = 0$$

не имеет решений.

Решение:

Сделаем замену: $t = x + \frac{1}{x}$. Уравнение примет следующий вид:

$$at^2 - (a + 1)t + (5 - 2a) = 0.$$

Поскольку квадратное уравнение $x^2 - tx + 1 = 0$ разрешимо тогда, и только тогда, когда $D = t^2 - 4 \geq 0$, то $t \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. Значит, областью значений функции $t(x) = x + \frac{1}{x}$ является множество $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Обозначим функцию $f(t) = at^2 - (a + 1)t + (5 - 2a)$. Равносильную задачу можно сформулировать так: найти все значения параметра a , при которых уравнение $at^2 - (a + 1)t + (5 - 2a) = 0$ не имеет решений на множестве $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Рассмотрим три случая:

- а) $a < 0$ — ветви параболы $f(t) = at^2 - (a + 1)t + (5 - 2a)$ направлены вниз.
- б) $a = 0$ — функция $f(t) = -t + 5$ является линейной.
- в) $a > 0$ — ветви параболы $f(t) = at^2 - (a + 1)t + (5 - 2a)$ направлены вверх.

В первом случае на интервале уравнение $f(t) = 0$ обязательно имеет корень $[2; +\infty)$, поскольку $f(2) = 4a - 2(a + 1) + (5 - 2a) = 3 > 0$ и ветви направлены вниз. Во втором случае существует единственный корень $t = 5$. Следовательно, значения $a \leq 0$ тоже не удовлетворяют нашему условию. Рассмотрим третий случай:

- 1) Уравнение $f(t) = 0$ не имеет корней. Значит, дискриминант квадратного уравнения $f(t) = 0$ отрицателен:

$$(a+1)^2 - 4a(5-2a) < 0 \Leftrightarrow 9a^2 - 18a + 1 < 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a \in \left(1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}; 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right).$$

Стоит отметить, что интервал целиком вложен во множество $a > 0$.

- 2) Все корни уравнения $f(t) = 0$ лежат в интервале $(-2; 2)$. Это верно, при выполнении трех условий:
- дискриминант квадратного уравнения $f(t) = 0$ неотрицателен;
 - вершина параболы лежит на интервале $(-2; 2)$;
 - $f(t)$ принимает положительные значения на краях интервала.

Получим соответствующую алгебраическую систему:

$$\begin{cases} a > 0, \\ (a+1)^2 - 4a(5-2a) \geq 0, \\ -2 < \frac{a+1}{2a} < 2, \\ 4a - 2(a+1) + (5-2a) > 0, \\ 4a + 2(a+1) + (5-2a) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a \in \left(-\infty; 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right] \cup \left[1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right), \\ a > \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a \in \left[1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right).$$

Объединяя ответы последних двух случаев, получим, что корней у исходного уравнения не будет при $a \in \left(1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right)$.

Ответ: $\left(1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right)$.

8. В треугольной пирамиде $ABCD$ суммы трех плоских углов при каждой из вершин B и C равны 180° и $AD = BC$. Длина высоты пирамиды, опущенной из вершины A , равна 40 см. Найдите радиус шара, вписанного в эту пирамиду.

Решение:

Сделаем плоскую развертку $EFGABC$ треугольной пирамиды в вершинах B и C , где грань DAB соответствует треугольнику FAB , грань $DBC - GBC$, грань $DAC - EAC$. Равные отрезки (в том числе, согласно условию) на рисунке отмечены одинаковыми засечками.




Рис. 10: к задаче №8

Докажем, что точка A лежит на EF . Действительно, отрезок BC

является средней линией треугольника EFG , значит $EF = 2BC$. В тоже время $EA = AF = BC$. То есть в неравенстве треугольника $EF \leq EA + AF$ достигается равенство, что может быть только если A лежит на EF .




Рис. 11: к задаче №8

Значит, ABC — треугольник, образованный средними линиями треугольника EFG . Следовательно, треугольники ABF , CGB , ECA и BAC равны. То есть все грани пирамиды равны между собой.

Пусть V — объем пирамиды, h — длина высоты пирамиды, опущенной из вершины A , а r — радиус вписанного в пирамиду шара. Поскольку все грани пирамиды равны, имеем:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot h,$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot (S_{ABC} + S_{DAB} + S_{DBC} + S_{DAC}) \cdot r = \frac{4}{3} \cdot S_{ABC} \cdot r.$$

Иными словами, $r = \frac{1}{4}h = 10$.

Ответ: 10 см.

2015 год

1 вариант

1. Какое из чисел больше и почему: 4,5 или $\sqrt{\frac{21}{8}} + \frac{17}{6}$?

Решение:

$$\frac{9}{2} - \frac{17}{6} \vee \sqrt{\frac{21}{8}} \Leftrightarrow \frac{5}{3} \vee \sqrt{\frac{21}{8}}$$

Возведем в квадрат обе части:

$$\frac{25}{9} \vee \frac{21}{8} \Leftrightarrow 25 \cdot 8 \vee 21 \cdot 9 \Leftrightarrow 200 \vee 189$$

Число слева больше.

Ответ: 4,5.

2. Решите уравнение

$$(x^2 - 8x + 16)(x^2 - 8x + 18) - 24 = 0.$$

Решение:

Сделаем замену:

$$t = (x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16 \geq 0.$$

Тогда уравнение приводится к квадратному

$$t^2 + 2t - 24 = 0$$

с корнями $t = 4$ и $t = -6$. Второй корень посторонний ($t \geq 0$).

Отсюда получаем решения:

$$(x - 4)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 6. \end{cases}$$

Ответ: 2; 6.

3. Решите уравнение

$$\sqrt{24} \cos x = \sqrt{11 \cos x - \cos 2x}.$$

Решение:

Сделаем замену:

$$\cos x = y \in [-1; 1].$$

Имеем уравнение с радикалами:

$$\sqrt{24}y = \sqrt{11y - (2y^2 - 1)}.$$

Поскольку справа стоит неотрицательное число, то с учетом $y \geq 0$ можно возвести уравнение в квадрат:

$$24y^2 = 11y - (2y^2 - 1) \Leftrightarrow 26y^2 - 11y - 1 = 0$$

Полученное квадратное уравнение имеет корни $y = \frac{1}{2}$ и $y = -\frac{1}{13}$, из которых второй посторонний, так как $y \geq 0$. Возвращаемся к исходной переменной:

$$\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} y^2 + 2xy = 40x, \\ 16x^2 + 8xy = 5y. \end{cases}$$

Решение:

Разложим на множители левые части уравнений:

$$\begin{cases} y(2x + y) = 40x, \\ 8x(2x + y) = 5y. \end{cases}$$

Если $x = 0$, то $y = 0$. Это является решением.

Если $x \neq 0$, то из первого уравнения $y \neq 0$ и $2x + y \neq 0$. Разделим первое уравнение на второе:

$$\frac{y}{8x} = \frac{8x}{y} \Rightarrow (y - 8x)(y + 8x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 8x, \\ y = -8x. \end{cases}$$

Подставляя $y = 8x$ в первое уравнение, получим уравнение: $80x^2 = 40x$. Откуда легко найти решение $x = \frac{1}{2}$, $y = 4$. Подставляя $y = -8x$, получим: $-48x^2 = -40x$. Откуда легко найти решение $x = \frac{5}{6}$, $y = -\frac{20}{3}$.

Ответ: $(0; 0)$; $(\frac{1}{2}; 4)$; $(\frac{5}{6}; -6\frac{2}{3})$.

5. Решите неравенство

$$\frac{\log_{25} \left(7 - \frac{x}{2}\right)}{\log_{125}(22 - x)} \leq \frac{3}{4}.$$

Решение:

Выпишем область допустимых значений:

$$\begin{cases} 7 - \frac{x}{2} > 0, \\ 22 - x > 0, \\ 22 - x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-\infty; 14).$$

Приведем логарифмы к основанию 5:

$$\frac{\frac{1}{2} \log_5 \left(7 - \frac{x}{2}\right)}{\frac{1}{3} \log_5(22 - x)} \leq \frac{3}{4} \Leftrightarrow \frac{\log_5 \left(7 - \frac{x}{2}\right)}{\log_5(22 - x)} \leq \frac{1}{2}.$$

С учетом допустимых значений получаем, что знаменатель всегда строго положителен, так как при $x < 14$ верно:

$$\log_5(22 - x) > \log_5(22 - 14) = \log_5 8 > 0.$$

Значит, можно домножить неравенство на положительный знаменатель:

$$2 \log_5 \left(7 - \frac{x}{2}\right) \leq \log_5 (22 - x).$$

Внесем множитель 2 в логарифм как степень и с учетом того, что основание логарифмов больше 1, получим:

$$\left(7 - \frac{x}{2}\right)^2 \leq 22 - x \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 24x + 108 \leq 0, \\ 22 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in [6; 18]$$

С учетом области допустимых значений, получаем окончательный ответ: $x \in [6; 14)$

Ответ: $[6; 14)$.

6. В треугольнике длины двух сторон равны 4 и 5, а длина биссектрисы угла между этими сторонами равна $\frac{20}{9}$. Найдите площадь этого треугольника.

Решение:

Подставим в формулу длины биссектрисы

$$l_b = \frac{2ab \cos \frac{\gamma}{2}}{a + b}$$

все известные параметры

$$\frac{20}{9} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos \frac{\gamma}{2}}{4 + 5} \Leftrightarrow \cos \frac{\gamma}{2} = \frac{1}{2}.$$

Учитывая, что $\gamma \in (0; 180^\circ)$, получаем $\gamma = 120^\circ$.

Воспользуемся формулой площади треугольника:

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ = 5\sqrt{3}.$$

Ответ: $5\sqrt{3}$.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$(x + 1)^4 - (a + 3)(x^2 + 2x) + a^2 + 3a + 1 = 0$$

имеет 4 различных корня, образующих арифметическую прогрессию.

Решение:

После замены $t = (x + 1)^2 \geq 0$ уравнение примет вид:

$$t^2 - (a + 3)t + (a^2 + 4a + 4) = 0.$$

Каждый положительный корень $t > 0$ данного уравнения дает два различных корня x исходного уравнения. Каждый отрицательный корень $t < 0$ не дает корней x , а нулевой корень $t = 0$ дает только один корень $x = 0$.

Чтобы исходное уравнение имело 4 различных корня, необходимо и достаточно, чтобы уравнение $t^2 - (a + 3)t + (a^2 + 4a + 4) = 0$ имело два положительных корня t_1 и t_2 . Знак корней определяется теоремой Виета, а существование корней условием $D > 0$:

$$\begin{cases} a + 3 > 0, \\ (a + 2)^2 > 0, \\ (a + 3)^2 - 4(a + 2)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \in \left(-\frac{7}{3}; -2\right) \cup (-2; -1)$$

Считаем, что $t_1 > t_2$. Корни исходного уравнения, выписанные в порядке возрастания:

$$-1 - \sqrt{t_1} < -1 - \sqrt{t_2} < -1 + \sqrt{t_2} < -1 + \sqrt{t_1}.$$

Данные корни образуют арифметическую прогрессию тогда, и только тогда, когда соседние корни отличаются на одну и ту же величину:

$$(-\sqrt{t_2}) - (-\sqrt{t_1}) = \sqrt{t_2} - (-\sqrt{t_2}) = \sqrt{t_1} - \sqrt{t_2}.$$

Эти соотношения эквивалентны условию $\sqrt{t_1} = 3\sqrt{t_2}$, то есть $t_1 = 9t_2$.

Согласно теореме Виета:

$$\begin{cases} 10t_2 = a + 3, \\ 9t_2^2 = (a + 2)^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{9}{100}(a + 3)^2 = (a + 2)^2 \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{7}, \\ a = -\frac{29}{13}. \end{cases}$$

Оба параметра a подходят, так как лежат во множестве $(-\frac{7}{3}; -2) \cup (-2; -1)$.

Ответ: $-2\frac{3}{13}; -1\frac{4}{7}$.

8. В правильной шестиугольной пирамиде с вершиной S и основанием $ABCDEF$ площадь сечения SAC относится к площади боковой грани SAB как $\sqrt{51} : \sqrt{19}$. Сторона основания равна 3. Найти объем данной шестиугольной пирамиды.

Решение:

Введем обозначения: M — середина отрезка AB ; N — середина отрезка AC ; O — центр основания ($h = SO$ — высота пирамиды).

Найдем площадь основания пирамиды, которое образует правильный шестиугольник $ABCDEF$:

$$S_{ABCDEF} = 6 \cdot S_{OAB} = \frac{a^2 \cdot 3\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2}.$$

Из шестиугольника $ABCDEF$ несложно найти $OM = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ и $ON = \frac{3}{2}$. По теореме Пифагора для прямоугольных треугольников SON и SOM :

$$SN = \sqrt{h^2 + \frac{9}{4}},$$




Рис. 12: к задаче №8

$$SM = \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}}.$$

Площади треугольников SAB и SAC :

$$S_{SAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot SM = \frac{3}{2} \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}},$$

$$S_{SAC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot SN = \frac{3\sqrt{3}}{2} \sqrt{h^2 + \frac{9}{4}}.$$

Согласно условию задачи:

$$\frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} \sqrt{h^2 + \frac{9}{4}}}{\frac{3}{2} \sqrt{h^2 + \frac{27}{4}}} = \frac{\sqrt{51}}{\sqrt{19}}$$

Найдем высоту пирамиды:

$$\frac{h^2 + \frac{9}{4}}{h^2 + \frac{27}{4}} = \frac{17}{19} \Rightarrow h^2 = 36 \Rightarrow h = 6.$$

Объем пирамиды:

$$V_{S_{ABCDEF}} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCDEF} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 6 = 27\sqrt{3}.$$

Ответ: $27\sqrt{3}$.

2016 год

1 вариант

1. Сколько различных решений имеет уравнение

$$7x^2 + 6x + 7 = 2\sqrt{10} \cdot (x^2 - 1)?$$

Решение:

Запишем квадратное уравнение в стандартном виде:

$$(7 - 2\sqrt{10})x^2 + 6x + (7 + 2\sqrt{10}) = 0.$$

Вычислим дискриминант: $D = 36 - 4(7 - 2\sqrt{10})(7 + 2\sqrt{10}) = 36 - 36 = 0$.**Ответ:** 1 корень.

2. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 5, \\ x^3 - y^3 = 335. \end{cases}$$

Решение:Разложим на множители второе уравнение: $(x - y)(x^2 + y^2 + xy) = 5 \cdot 67$. Так как $x - y = 5$, то получаем, что $x^2 + y^2 + xy = 67$. Выделим полный квадрат и подставим первое соотношение: $(x - y)^2 + 3xy = 67 \Leftrightarrow xy = 14$. Получаем систему:

$$\begin{cases} x - y = 5, \\ xy = 14. \end{cases}$$

Выражая из первого соотношения $x = y + 5$ и подставляя во второе, получим квадратное уравнение $(y + 5)y = 67$ с решениями $y = 2$ и $y = -7$. Соответствующие x равны 7 и -2 .**Ответ:** $(7; 2); (-2; -7)$.

3. Дана квадратная таблица 10×10 клеток (10 строк, 10 столбцов). В каждой клетке таблицы стоит число. Известно, что при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку, расположенную ниже, число увеличивается на 4, а при переходе из любой клетки в соседнюю с ней клетку справа число уменьшается на 1. Сумма всех чисел в таблице равна 250. Какое число стоит в самой левой клетке нижнего ряда?

Решение:

Пронумеруем строки снизу вверх от 1 до 10. Рассмотрим все числа, записанные в k -й строке. Они образуют арифметическую прогрессию с разностью (-1) (слева направо). Если первое число в строке равно a_k , то последнее число равно $a_k - 9$.

a_{10}	$a_{10} - 1$...	$a_{10} - 8$	$a_{10} - 9$
a_9	$a_9 - 1$...	$a_9 - 8$	$a_9 - 9$
...
a_k	$a_k - 1$...	$a_k - 8$	$a_k - 9$
...
a_2	$a_2 - 1$...	$a_2 - 8$	$a_2 - 9$
a_1	$a_1 - 1$...	$a_1 - 8$	$a_1 - 9$

Легко найти сумму всех чисел в k -й строке:

$$S_k = \frac{a_k + (a_k - 9)}{2} \cdot 10 = 10a_k - 45.$$

Если сложить все суммы строк S_k , то получим сумму всех чисел в таблице:

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 + \dots + S_{10} = \\ &= (10a_1 - 45) + (10a_2 - 45) + \dots + (10a_{10} - 45) = 10(a_1 + a_2 + \dots + a_{10}) - 450. \end{aligned}$$

Заметим, что числа a_1, a_2, \dots, a_{10} , записанные в первом столбце, образуют арифметическую прогрессию с разностью (-4) (снизу

вверх). Поэтому число в верхней строке: $a_{10} = a_1 - 9 \cdot 4 = a_1 - 36$. А сумму всех чисел в левом столбце можно найти как сумму арифметической прогрессии:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = 10(a_1 - 18).$$

Значит, сумма всех чисел таблицы равна $S = 100(a_1 - 18) - 450$. Исходя из условия, что $S = 250$, несложно найти $a_1 = 25$.

Ответ: 25.

4. Решите неравенство

$$\sqrt{7 + 2^{\log_x 5}} \geq 1 + 4^{\log_x \sqrt{5}}.$$

Решение:

Замена $t = \log_x 5$. Выражение справа: $4^{\log_x \sqrt{5}} = 4^{\frac{t}{2}} = 2^t$. При подстановке получим неравенство:

$$\sqrt{7 + 2^t} \geq 1 + 2^t.$$

Сделаем еще одну замену: $a = 2^t > 0$. Это приводит к стандартному неравенству с радикалами:

$$\sqrt{7 + a} \geq 1 + a.$$

Так как $a > 0$, то правая часть всегда положительна. Возведем обе части неравенства в квадрат:

$$7 + a \geq 1 + 2a + a^2 \Leftrightarrow a^2 + a - 6 \leq 0.$$

Данное квадратичное неравенство имеет решение $a \in [-3, 2]$. Вернемся к переменной t :

$$\begin{cases} 2^t \geq -3, \\ 2^t \leq 2 \end{cases}$$

Первое неравенство всегда верно. Соответственно, данная система эквивалентна неравенству $t \leq 1$. Перейдем к переменной x :

$$\log_x 5 \leq 1 \Leftrightarrow \log_x 5 \leq \log_x x$$

Если $0 < x < 1$, то при снятии логарифмов знак меняется на противоположный: $5 \geq x$. Ответом будет интервал $x \in (0, 1)$.

Если же $x > 1$, то при снятии логарифмов знак остается: $5 \leq x$. Ответом будет полуинтервал $x \in [5, +\infty)$.

Ответ: $(0; 1) \cup [5; +\infty)$.

5. Решите уравнение

$$\operatorname{tg} 2x = 9 \sin^2 x + 4 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x.$$

Решение:

Запишем синус двойного угла ($2 \sin x \cos x = \sin 2x$):

$$\operatorname{tg} 2x = 9 \sin^2 x + 2 \sin 2x - 3 \cos^2 x.$$

Выразим тангенс ($\sin 2x = \operatorname{tg} 2x \cos 2x$) и сгруппируем выражения:

$$\operatorname{tg} 2x = 9 \sin^2 x + 2 \operatorname{tg} 2x \cos 2x - 3 \cos^2 x$$

$$\operatorname{tg} 2x(1 - 2 \cos 2x) = 3(3 \sin^2 x - \cos^2 x).$$

С помощью формул понижения выразим правую часть через $\cos 2x$:

$$3 \sin^2 x - \cos^2 x = \frac{3}{2}(1 - \cos 2x) - \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) = 1 - 2 \cos 2x$$

Разложим на множители:

$$\operatorname{tg} 2x(1 - 2 \cos 2x) = 3(1 - 2 \cos 2x)$$

$$(\operatorname{tg} 2x - 3)(1 - 2 \cos 2x) = 0.$$

Приравняем к нулю первый множитель:

$$\operatorname{tg} 2x = 3 \Leftrightarrow 2x = \operatorname{arctg} 3 + \pi k, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Приравняем к нулю второй множитель:

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

6. В четырехугольнике $ABCD$ сторона AD в $\sqrt{\frac{19}{4}}$ раз длиннее стороны BC и $AB = CD = 2$. Продолжения сторон AB (за точку B) и DC (за точку C) пересекаются в точке K , при этом $BK = 1$, $CK = 2$. Найдите площадь четырехугольника $ABCD$.

Решение:

Обозначим $\angle AKD = \alpha$. Выпишем теорему косинусов для треугольников AKD и BKC :

$$AD^2 = AK^2 + KD^2 - 2 \cdot AK \cdot KD \cdot \cos \alpha = 25 - 24 \cos \alpha$$

$$BC^2 = BK^2 + KC^2 - 2 \cdot BK \cdot KC \cdot \cos \alpha = 5 - 4 \cos \alpha$$

Подставим в соотношение $\frac{AD^2}{BC^2} = \frac{19}{4}$ полученные выше выражения для AD^2 и BC^2 :

$$\frac{25 - 24 \cos \alpha}{5 - 4 \cos \alpha} = \frac{19}{4} \Leftrightarrow 100 - 96 \cos \alpha = 95 - 76 \cos \alpha \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{1}{4}.$$

Далее по основному тригонометрическому тождеству легко найти $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ и площадь $ABCD$ как разность площадей треугольников AKD и BKC :

$$S_{ABCD} = S_{AKD} - S_{BKC} = \frac{1}{2} AK \cdot KD \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2} BK \cdot KC \cdot \sin \alpha =$$




Рис. 13: к задаче №6

$$= \frac{\sin \alpha}{2} (AK \cdot KD - BK \cdot KC) = \frac{5\sqrt{15}}{4}.$$

Ответ: $\frac{5\sqrt{15}}{4}$.

7. Найдите все целочисленные решения уравнения

$$\cos \frac{(10x - 48)\pi}{3x + 5} = 1.$$

Решение:

$$\frac{(10x - 48)\pi}{3x + 5} = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Преобразуем уравнение с двумя неизвестными:

$$5x - 24 = n(3x + 5) \Leftrightarrow 3nx + 5n - 5x + 24 = 0.$$

Техника решения уравнений данного типа стандартна: разложим левую часть на два множителя так, чтобы в правой части было некоторое целое число, не зависящее от n и x .

$$n(3x + 5) - 5x + 24 = 0.$$

Для разложения на множители с целыми коэффициентами, домножим всё уравнение на 3:

$$\begin{aligned} 3n(3x + 5) - 5 \cdot 3x + 72 = 0 &\Leftrightarrow 3n(3x + 5) - 5(3x + 5) + 97 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (3n - 5)(3x + 5) = -97. \end{aligned}$$


Число 97 — простое (делится только на себя и на 1). Поэтому произведение двух целых чисел равно (-97) только в том случае, если это одна из пар чисел $(97, -1)$, $(1, -97)$, $(-1, 97)$ или $(-97, 1)$. Подставляя каждую из этих пар, получим системы:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3n - 5 = 97, \\ 3x + 5 = -1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} n = 34, \\ x = -2 \end{cases} & \begin{cases} 3n - 5 = 1, \\ 3x + 5 = -97 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} n = 2, \\ x = -34 \end{cases} \\ \begin{cases} 3n - 5 = -1, \\ 3x + 5 = 97 \end{cases} &\Leftrightarrow \emptyset & \begin{cases} 3n - 5 = -97, \\ 3x + 5 = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \emptyset \end{aligned}$$

Ответ: $-34; -2$.

8. В правильной треугольной пирамиде радиус вписанного шара в 3 раза короче высоты и равен $7 + \sqrt{21}$. Найдите радиус шара, который касается всех ребер пирамиды.

Решение:



Обозначим r и O — радиус и центр шара, касающегося всех граней, R и Q — радиус и центр шара, касающегося всех ребер. Проведем высоту пирамиды SH . В силу симметрии (по условию пирамида — правильная) центры O и Q лежат на SH . Также известно, что $SH = 3r$ и $SO = 2r$.

Выразим все стороны пирамиды через r . Введем обозначения: M — середина стороны BC , K — точка касания вписанного шара с плоскостью SBC . Плоскость ASM перпендикулярна плоскости SBC . Следовательно, K лежит на SM .

Известно, что $\frac{OK}{OS} = \frac{r}{2r} = \frac{1}{2}$. Значит, угол $\angle OSK = 30^\circ$, $SK = \sqrt{3} \cdot r$. Так как треугольники SOK и SMH — подобны ($\angle K = \angle H = 90^\circ$, $\angle S$ — общий), то верно:

$$HM = \sqrt{3} \cdot r, MS = 2\sqrt{3} \cdot r.$$

Из равностороннего треугольника ABC легко получить:

$$AM = 3\sqrt{3}r, AH = 2\sqrt{3}r, CM = 3r.$$

Из прямоугольного треугольника MSC по теореме Пифагора можно найти $SC = \sqrt{21}r$. Соответственно:

$$SA = SB = SC = \sqrt{21}r.$$

Перейдем к нахождению соотношения между R и r . Обозначим через L — точку касания шара с центром Q и радиуса R ребра AS .




Рис. 14: к задаче №8

Треугольники ASH и QSL подобны:

$$SQ = \frac{LQ}{HA} \cdot SA = \frac{R}{2\sqrt{3} \cdot r} \sqrt{21} \cdot r = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot R.$$

Соответственно:

$$QH = SH - SQ = 3r - \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot R.$$

Чтобы найти явную связь между R и r , выпишем теорему Пифагора для треугольника QHM :

$$R^2 = (\sqrt{3} \cdot r)^2 + \left(3r - \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot R\right)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 = 12r^2 - 3\sqrt{7} \cdot rR + \frac{3}{4}R^2$$

Поделим уравнение на r^2 и обозначим $t = \frac{R}{r}$:

$$3t^2 - 12\sqrt{7}t + 48 = 0.$$

Дискриминант квадратного уравнения: $D = 12^2 \cdot 7 - 4 \cdot 3 \cdot 48 = 6^2 \cdot 3$.
Значит:

$$t = 2(\sqrt{7} \pm \sqrt{3}).$$

Большой корень посторонний, так как из треугольника SHM получаем, что:

$$QM < SM \Leftrightarrow R < 2\sqrt{3}r \Leftrightarrow t < 2\sqrt{3}.$$

Для меньшего корня несложно найти ответ:

$$R = 2(\sqrt{7} - \sqrt{3})r = 2(\sqrt{7} - \sqrt{3})(7 + \sqrt{21}) = 8\sqrt{7}.$$

Ответ: $8\sqrt{7}$.

2017 год

1 вариант

1. Найдите все целые числа, которые лежат между числами $\sqrt{3} \cdot \sqrt{85}$ и $\frac{14-1,7}{3-2,3}$.

Решение:

Оценим первое число:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{85} = \sqrt{255} \in (15, 16)$$

Оценим второе число:

$$\frac{14 - 1,7}{3 - 2,3} = \frac{12,3}{0,7} = \frac{123}{7} = 17\frac{4}{7} \in (17, 18).$$

Ответ: 16; 17.

2. Решите уравнение $|x^2 - 14x + 48| = 14x - 42 - x^2$.

Решение:

Сделаем замену выражения под модулем $t = x^2 - 14x + 48$. Тогда правая часть выражается как $6 - (x^2 - 14x + 48) = 6 - t$:

$$|t| = 6 - t.$$

Раскроем модуль. В случае $t \geq 0$:

$$t = 6 - t$$

$$t = 3$$

При возврате к исходной переменной x получаем квадратное уравнение $x^2 - 14x + 45 = 0$. Корни: $x = 5$ и $x = 9$.

В случае $t < 0$:

$$-t = 6 - t$$

$$0 = 6$$

В данном случае решений нет.

Ответ: 5; 9.

3. В 9 коробках с номерами от 1 до 9 лежат только красные и синие шары. Число красных шаров во второй коробке в $\frac{7}{6}$ раз больше, чем в первой. Количества красных шаров в коробках образуют арифметическую прогрессию, а количества синих шаров в коробках образуют геометрическую прогрессию (в порядке номеров коробок). Количество синих шаров в первой коробке составляет 25%, а в третьей — 50% от числа всех шаров в данной коробке. Найти отношение общего числа синих шаров к общему числу красных шаров.

Решение:

Обозначим a_i — количество красных шаров в i -й коробке (арифметическая прогрессия), b_i — количество синих шаров в i -й коробке (геометрическая прогрессия). По условию:

$$\begin{cases} a_2 = \frac{7}{6}a_1 \\ b_1 = 0.25(a_1 + b_1) \\ b_3 = 0.5(a_3 + b_3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a_2 = 7a_1 \\ 3b_1 = a_1 \\ b_3 = a_3 \end{cases}$$

Пусть d — разность арифметической прогрессии (a_i) , q — знаменатель геометрической прогрессии (b_i) . Подставим $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$, $b_3 = b_1q^2$ и выразим все неизвестные через d :

$$\begin{cases} 6(a_1 + d) = 7a_1 \\ 3b_1 = a_1 \\ b_1 \cdot q^2 = a_1 + 2d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 6d \\ b_1 = 2d \\ 2d \cdot q^2 = 8d \end{cases}$$

Из последнего уравнения получаем, что либо $d = 0$, либо $q^2 = 4$. В первом случае $a_1 = b_1 = 0$ — означает, что все корзины пустые.

Во втором случае подходит только $q = 2$, так как количество шаров $b_2 = b_1 \cdot q$ не может быть отрицательным.

Найдем общее количество красных шаров (сумма членов арифметической прогрессии):

$$a_1 + a_2 + \dots + a_9 = \frac{a_1 + a_9}{2} \cdot 9 = \frac{6d + 14d}{2} \cdot 9 = 90d$$

Найдем общее количество синих шаров (сумма членов геометрической прогрессии):

$$b_1 + b_2 + \dots + b_9 = \frac{q^9 - 1}{q - 1} \cdot b_1 = 511 \cdot 2d = 1022d$$

Ответ: $\frac{511}{45}$.

4. Решите уравнение

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Решение:

Раскроем синус суммы:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x - \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin 2x + \cos 2x - \sqrt{2} \sin x = 1$$

Применим формулы двойного угла для синуса и для косинуса:

$$2 \sin x \cos x + 1 - 2 \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 1$$

$$(2 \cos x - 2 \sin x - \sqrt{2}) \sin x = 0$$

В первом случае:

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Во втором случае:

$$\cos x - \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

По формуле дополнительного аргумента:

$$\sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Отдельно выпишем ответ для каждого знака:

$$\begin{cases} x = -\frac{7\pi}{12} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{12} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Ответ: $\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{7\pi}{12} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{12} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^{\log_y x} = \frac{y^2}{x}, \\ (\log_3 x^2) \cdot \log_x \left(2x - \frac{3}{y} \right) = 4 \end{cases}$$

Решение:

Выпишем область допустимых значений: $x > 0, x \neq 1, y > 0, y \neq 1, xy > \frac{3}{2}$.

Рассмотрим второе уравнение. Применим формулу $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$:

$$2 \log_3 x \log_x \left(2x - \frac{3}{y} \right) = 4 \Leftrightarrow \log_3 \left(2x - \frac{3}{y} \right) = 2 \Leftrightarrow 2x - \frac{3}{y} = 9$$

Прологарифмируем первое уравнение по основанию x :

$$\log_y x = 2 \log_x y - 1$$

Сделаем замену $\log_y x = t$:

$$t = \frac{2}{t} - 1 \Leftrightarrow \frac{t^2 + t - 2}{t} = 0$$

Корни: $t = 1$, $t = -2$. Возвращаясь к переменным x и y , получаем два случая: $\log_y x = 1$ или $\log_y x = -2$.

1) В первом случае $x = y$. Второе уравнение примет вид:

$$2x - \frac{3}{x} = 9 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 9x - 3}{x} = 0$$

Первое решение $x = \frac{9 - \sqrt{105}}{4}$ не удовлетворяет условию $x > 0$.

Второе решение $x = \frac{9 + \sqrt{105}}{4}$ подходит, так как

$$xy = x^2 = \left(\frac{9 + \sqrt{105}}{4} \right)^2 > \left(\frac{18}{4} \right)^2 > \frac{3}{2}.$$

2) Во втором случае $x = \frac{1}{y^2}$. Второе уравнение:

$$\frac{2}{y^2} - \frac{3}{y} = 9 \Leftrightarrow \frac{9y^2 + 3y - 2}{y^2} = 0$$

Первое решение $y = -\frac{2}{3}$ отбрасываем ($y > 0$ не выполняется). Второе решение $y = \frac{1}{3}$ дает $x = 9$, что удовлетворяет области допустимых значений.

Ответ: $(9; \frac{1}{3}), \left(\frac{9 + \sqrt{105}}{4}; \frac{9 + \sqrt{105}}{4} \right)$.


6. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ $\angle B = \angle C = 60^\circ$, $AD = 21$, $BC = 40$. Окружность с центром на стороне BC касается сторон AB , AD и CD . Найдите длины сторон AB и CD .

Решение:

Первое дополнительное построение: продолжим стороны BA и CD до пересечения в точке K . Так как два угла треугольника BCK равны по 60° , то он будет правильным. Причем длины всех сторон треугольника равны 40.

Обозначим $AB = x$, $CD = y$. Получаем, что $AK = 40 - x$, $DK = 40 - y$. Теорема косинусов для треугольника KCD дает:

$$(40 - x)^2 + (40 - y)^2 - 2(40 - x)(40 - y) \cdot \frac{1}{2} = 21^2.$$



Второе дополнительное построение: проведем размеры OF , OH и OE к точкам касания с BA , AD и DC , соответственно. Треугольники OBF и OCE — равные прямоугольные треугольники ($\angle B = \angle C = 60^\circ$, $OF = OE$ как радиусы). Значит, $BO = OC = 20$. Из этих же прямоугольных треугольников получаем, что $BF = CE = 10$. Следовательно, $AF = x - 10$, $DE = y - 10$.

Заметим, что, по свойству касательных: $AH = AF = x - 10$, $DH = DE = y - 10$. По условию $AD = 21$. Следовательно,

$$(x - 10) + (y - 10) = 21,$$

$$x + y = 41.$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} (40 - x)^2 + (40 - y)^2 - 2(40 - x)(40 - y) \cdot \frac{1}{2} = 21^2 \\ x + y = 41 \end{cases}$$

Находим, что $40 - y = x - 1$ и подставляем в первое уравнение:

$$(40 - x)^2 + (x - 1)^2 - (40 - x)(x - 1) = 21^2,$$

$$3x^2 - 123x + 1200 = 0,$$

$$x^2 - 41x + 400 = 0.$$

Получаем, что $x = 16$ или $x = 25$. Значения второй неизвестной: $y = 25$ и $y = 16$, соответственно. Простая проверка показывает, что оба случая возможны.

Ответ: (25; 16) и (16; 25).

7. Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$13 + \sin^2 x > 3a^2 - a + (4a - 5) \cos x$$

выполняется для всех x .

Решение:

Обозначим $t = \cos x$. Неравенство перепишем в виде:

$$13 + 1 - t^2 > 3a^2 - a + (4a - 5)t,$$

$$t^2 + (4a - 5)t + (3a^2 - a - 14) < 0.$$

Необходимо найти все значения параметра a , при которых данное неравенство выполняется при всех $t \in [-1; 1]$.

График функции $f(t) = t^2 + (4a - 5)t + (3a^2 - a - 14)$ — парабола с ветвями, направленными вверх и является выпуклой функцией. Для того, чтобы неравенство $f(t) < 0$ выполнялось при всех $t \in [-1, 1]$, необходимо и достаточно потребовать, чтобы $f(-1) < 0$ и $f(1) < 0$. Действительно, если эта пара неравенств выполняется, то $f(t) < 0$ при все $t \in [-1, 1]$ в силу выпуклости функции. Обратное утверждение очевидно. Имеем:

$$\begin{cases} 1 + (4a - 5) + 3a^2 - a - 14 < 0 \\ 1 - (4a - 5) + 3a^2 - a - 14 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + a - 6 < 0 \\ 3a^2 - 5a - 8 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \in (-3; 2) \\ a \in (-1; \frac{8}{3}) \end{cases} \Leftrightarrow a \in (-1; 2).$$

Ответ: $(-1; 2)$.

8. В правильную четырехугольную пирамиду $SABCD$ (S — вершина пирамиды) вписан шар. Через центр шара и ребро AB проведена плоскость, которая в пересечении с пирамидой дает четырехугольник $ABMN$. Объемы пирамид $SABMN$ и $SABCD$ относятся как $5 : 9$. Найдите косинус двугранного угла между боковой гранью и основанием исходной пирамиды.

Решение:




Рис. 15: к задаче №8

Искомый двугранный угол обозначим $\angle SEH = \alpha$. Длину апофемы обозначим $SF = SE = b$. Стороны основания тогда равны $a = 2b \cos \alpha$.

Пусть T, E, F, H — середины сторон NM, AB, CD и EF , соответственно. Четырехугольник $ABMN$ — плоский. Значит, либо прямая AB пересекает MN на прямой CD (общая прямая граней

$MNCD$ и $ABCD$), либо все три прямые параллельны. Первый вариант невозможен, так как прямая AB параллельна CD . Получаем, что $ABMN$ — трапеция. Так как пирамида $SABCD$ — правильная, то все боковые грани являются равнобедренными треугольниками. Значит, $DCMN$ — равнобедренная трапеция. Тогда треугольники AND и BCS равны и, следовательно, трапеция $ABMN$ равнобедренная. Центр шара O будет лежать на прямой TE и будет центром вписанной окружности треугольника SEF .

Объем пирамиды $SABMN$ равен $\frac{1}{3} \cdot h \cdot S_{ABMN}$, где h — расстояние от вершины S до плоскости $ABMN$. Так как O — центр вписанной в треугольник SFE окружности, то $\angle SET = \frac{\alpha}{2}$. Поэтому $h = SE \cdot \sin \angle SET = SE \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$. Объем пирамиды $SABCD$ равен $\frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABCD}$. Отношение объемов равно:

$$\frac{5}{9} = \frac{S_{ABMN} \cdot SE \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{S_{ABCD} \cdot SH} = \frac{(AB + MN) \cdot TE \cdot SE \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{2 \cdot AB^2 \cdot SH}.$$

Выразим все через a , b .

Ясно, что ET — биссектриса угла SEF . По формуле для биссектрисы:

$$ET = \frac{2ab \cos \frac{\alpha}{2}}{a + b}.$$

Длину MN определим из подобия треугольников SMN и SCD : $\frac{MN}{CD} = \frac{ST}{SF}$. По свойству биссектрисы имеем: $\frac{ST}{TF} = \frac{SE}{EF}$. Это значит, что $\frac{ST}{SF} = \frac{SE}{SE+EF} = \frac{b}{b+a}$. Получаем:

$$MN = \frac{ab}{a + b}.$$

Длину SH найдем из прямоугольного треугольника SHE :

$$SH = b \sin \alpha.$$

Для отношения объемов имеем:

$$\frac{5}{9} = \frac{\left(a + \frac{ab}{a+b}\right) \cdot \frac{2ab \cos \frac{\alpha}{2}}{a+b} \cdot b \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{2 \cdot a^2 \cdot b \cdot \sin \alpha} = \frac{\left(1 + \frac{b}{a+b}\right) \cdot \frac{1}{a+b} \cdot b}{2} = \frac{ab + 2b^2}{2(a+b)^2}.$$

Пусть $t = \cos \alpha$. Тогда:

$$\frac{5}{9} = \frac{2b^2t + 2b^2}{2(2bt + b)^2} = \frac{t + 1}{(2t + 1)^2},$$

$$20t^2 + 20t + 5 = 9t + 9 \Leftrightarrow 20t^2 + 11t - 4 = 0.$$

Из двух корней $t = -\frac{4}{5}$ и $t = \frac{1}{4}$ подходящим является только положительный, так как двугранный угол при основании пирамиды не может быть тупым.

Ответ: $\frac{1}{4}$.

2018 год

1 вариант

1. Какое целое число задано выражением $\frac{\sqrt{8} \cdot (\frac{5}{3} + \frac{1}{5})}{(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}) \cdot \sqrt{32}}$?

Решение:

Простые вычисления сразу приводят к ответу:

$$\frac{\sqrt{8} \cdot (\frac{5}{3} + \frac{1}{5})}{(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}) \cdot \sqrt{32}} = \frac{(\frac{5}{3} + \frac{1}{5})}{2(\frac{2}{3} - \frac{1}{5})} = \frac{\frac{28}{15}}{2 \cdot \frac{7}{15}} = 2.$$

Ответ: 2.

2. Решить уравнение:

$$\sqrt{10x + 6} = 5x - 9.$$

Решение:

Выражение слева неотрицательно, поэтому выражение справа тоже:

$$5x - 9 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{9}{5}.$$

Возведем обе части уравнения в квадрат:

$$10x + 6 = 25x^2 - 90x + 81 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Из двух корней $x = 1$, $x = 3$ подходит только $x = 3$.

Ответ: 3.

3. Решить неравенство:

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{x}} \leq \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{3-x}}.$$

Решение:


Приведем обе степени к основанию $\frac{3}{2}$:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-\frac{6}{x}} \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{2}{3-x}}.$$

Основание $\frac{3}{2} > 1$, поэтому для показателей знак неравенства сохраняется:

$$-\frac{6}{x} \leq \frac{2}{3-x} \Leftrightarrow \frac{-6(3-x) - 2x}{x(3-x)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{4x - 18}{x(3-x)} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



$$x \in (0, 3) \cup [4.5; +\infty)$$

Ответ: $x \in (0, 3) \cup [4.5; +\infty)$.

4. В геометрической прогрессии 50 членов (все положительные). Если просуммировать логарифмы по основанию 2 от каждого члена прогрессии, то получится 1325. Если вычислить сумму логарифмов по основанию 2 только первых 30 членов, то получится 495. Вычислите сумму первых 10 членов прогрессии.

Решение:

Обозначим члены прогрессии через b_1, b_2, \dots, b_{50} , а через q — знаменатель геометрической прогрессии. С учетом того, что $b_k =$

$b_1 q^{k-1}$, преобразуем сумму логарифмов по основанию 2 первых n членов:

$$\begin{aligned} \log_2 b_1 + \log_2 b_2 + \dots + \log_2 b_n &= \log_2 (b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n) = \\ &= \log_2 (b_1 \cdot b_1 \cdot q \cdot b_1 \cdot q^2 \cdot \dots \cdot b_1 \cdot q^{n-1}) = \log_2 (b_1^n \cdot q^{1+2+3+\dots+(n-1)}) = \\ &= n \log_2 b_1 + (1+2+3+\dots+(n-1)) \cdot \log_2 q = n \log_2 b_1 + \frac{n(n-1)}{2} \log_2 q. \end{aligned}$$

Теперь перепишем условие задачи в виде следующих уравнений:

$$\begin{cases} 50 \log_2 b_1 + \frac{50 \cdot 49}{2} \cdot \log_2 q = 1325 \\ 30 \log_2 b_1 + \frac{30 \cdot 29}{2} \cdot \log_2 q = 495 \end{cases}$$

После сокращений имеем:

$$\begin{cases} 2 \log_2 b_1 + 49 \log_2 q = 53 \\ 2 \log_2 b_1 + 29 \log_2 q = 33 \end{cases}$$

Вычтем из первого уравнения второе: $\log_2 q = 1$, то есть $q = 2$. Соответственно, $\log_2 b_1 = 2$, то есть $b_1 = 4$.

Остается найти сумму первых 10 членов геометрической прогрессии:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{10} = \frac{q^{10} - 1}{q - 1} \cdot b_1 = (2^{10} - 1) \cdot 4 = 4092.$$

Ответ: 4092.

5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 5 \sin y - 3\sqrt{5} \cos x = 7 - 2 \cos^2 y, \\ \operatorname{tg} x = 2. \end{cases}$$

Решение:

Решим второе уравнение:

$$x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Найдем $\cos x$ из второго уравнения и основного тригонометрического тождества:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{1}{5}.$$

Согласуем знак $\cos x$ с решениями второго уравнения.

- 1) Если угол x лежит в первой четверти, то $x = \operatorname{arctg} 2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ и $\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$5 \sin y - 3 = 7 - 2 \cos^2 y.$$

Замена: $t = \sin y \in [-1, 1]$. Тогда:

$$5t - 3 = 7 - 2(1 - t^2),$$

$$2t^2 - 5t + 8 = 0.$$

Решений нет.

- 2) Если угол x лежит в третьей четверти, то $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ и $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$:

$$5 \sin y + 3 = 7 - 2 \cos^2 y.$$

Замена $t = \sin y \in [-1, 1]$. Тогда:

$$5t + 3 = 7 - 2(1 - t^2),$$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0.$$

Из двух решений $t = 2, t = \frac{1}{2}$ подходит только второе: $\sin y = \frac{1}{2}$. То есть,

$$y = (-1)^m \frac{\pi}{6} + \pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left(\arctg 2 + \pi + 2\pi k; (-1)^m \frac{\pi}{6} + \pi m \right), k, m \in \mathbb{Z}$.

6. В треугольнике ABC со сторонами: $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 6$ проведены высоты AH_1 , BH_2 , CH_3 . Найдите отношение длин отрезков $H_1H_3 : H_2H_3$.

Решение:




Рис. 16: к задаче №6

Обозначим $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle ACB = \gamma$. Определим $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ по теореме косинусов:

$$\cos \alpha = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{4^2 + 6^2 - 5^2}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{9}{16} > 0,$$

$$\cos \beta = \frac{BA^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot BA \cdot BC} = \frac{4^2 + 5^2 - 6^2}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{8} > 0,$$

$$\cos \gamma = \frac{CA^2 + CB^2 - AB^2}{2 \cdot CA \cdot CB} = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{3}{4} > 0.$$

Ясно, что треугольник ABC остроугольный.

Треугольник AH_2H_3 подобен треугольнику ABC , так как угол A — общий, а прилежащие стороны пропорциональны, то есть

$$\frac{AH_2}{AB} = \cos \alpha = \frac{AH_3}{AC}.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \frac{H_2H_3}{BC} &= \cos \alpha, \\ H_2H_3 &= BC \cdot \cos \alpha = 5 \cdot \frac{9}{16} = \frac{45}{16}. \end{aligned}$$

Аналогично, треугольник BH_1H_3 подобен треугольнику BAC , так как угол B — общий, а прилежащие стороны пропорциональны (коэффициент подобия равен $\cos \beta$). Следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{H_1H_3}{AC} &= \cos \beta, \\ H_1H_3 &= AC \cdot \cos \beta = 6 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Находим ответ: $\frac{H_1H_3}{H_2H_3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{16}{45} = \frac{4}{15}$.

Ответ: 4 : 15.

7. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение

$$|(2 - a)x - a| = (2 - a)(x + 1)^2 + 2ax - 2x + 2a$$

имеет ровно одно решение.

Решение:

Сделаем замену переменной $t = x + 1$. Имеем:

$$|(2 - a)t - 2| = (2 - a)t^2 + (2a - 2)t + 2.$$

Обозначим $b = 2 - a$. Тогда уравнение примет вид:

$$|bt - 2| = bt^2 + (2 - 2b)t + 2.$$

Легко убедиться, что $t = 0$ является решением при любых значениях параметра b . Достаточно найти такие b , при которых решений отличных от нуля нет.

Если $b = 0$, то уравнение примет вид:

$$2 = 2t + 2,$$

которое как раз имеет только решение $t = 0$. Соответственно, $a = 2$ входит в ответ.

Пусть $b \neq 0$. Замена $z = bt$. Тогда $t = \frac{z}{b}$ и

$$|z - 2| = \frac{z^2}{b} + \frac{(2 - 2b)z}{b} + 2.$$

Или:

$$b|z - 2| = z^2 + (2 - 2b)z + 2b.$$

Определим все значения параметра b такие, при которых уравнение не имеет ненулевых решений z ни в одном из двух случаев, которые образуются при раскрытии модуля:

1) Пусть $z \geq 2$. Тогда уравнение выглядит следующим образом:

$$bz - 2b = z^2 + (2 - 2b)z + 2b.$$

Или:

$$z^2 + (2 - 3b)z + 4b = 0.$$

Уравнение не должно иметь решений $z \geq 2$. То есть, либо корней нет, либо корни меньше 2. Обозначим $f(z) = z^2 + (2 - 3b)z + 4b$.

В первом случае $D < 0$:

$$(2 - 3b)^2 - 16b < 0 \Leftrightarrow 9b^2 - 28b + 4 < 0 \Leftrightarrow$$

$$b \in \left(\frac{14 - 4\sqrt{10}}{9}; \frac{14 + 4\sqrt{10}}{9} \right).$$

Во втором случае корни существуют, но меньше 2. Это условие запишем в виде системы:

$$\begin{cases} D \geq 0 \\ z_B < 2 \\ f(2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b \in \left(-\infty; \frac{14-4\sqrt{10}}{9} \right] \cup \left[\frac{14+4\sqrt{10}}{9}; +\infty \right) \\ -\frac{2-3b}{2} < 2 \\ 4 + (2-3b) \cdot 2 + 4b > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} b \in \left(-\infty; \frac{14-4\sqrt{10}}{9} \right] \cup \left[\frac{14+4\sqrt{10}}{9}; +\infty \right) \\ b < 2 \\ b < 4 \end{cases} \Leftrightarrow b \in \left(-\infty; \frac{14 - 4\sqrt{10}}{9} \right].$$

Вспоминая, что $b \neq 0$, находим:

$$b \in (-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{14 - 4\sqrt{10}}{9} \right].$$

Значит, корней $z \geq 2$ не будет при

$$b \in (-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{14 + 4\sqrt{10}}{9} \right].$$

2) Пусть $z < 2$. Тогда:

$$2b - bz = z^2 + (2 - 2b)z + 2b,$$

$$z^2 + (2 - b)z = 0.$$

$z = 0$ является решением в любом случае. А решение $z = b - 2$ должно быть посторонним или совпадать с первым решением. В первом случае $b - 2 \geq 2$, то есть $b \geq 4$. Во втором случае $b = 2$.

Значит, корней $z < 2$ не будет при

$$b \in \{2\} \cup [4; +\infty).$$

То есть, мы можем сделать вывод: уравнение не имеет решений $z \neq 0$ только при $b = 2$ (при $a = 0$).

Ответ: $\{0; 2\}$.

8. В треугольной пирамиде $SABC$ длины всех ребер одинаковы. Точка M в пространстве такова, что $MA = MB = MC = \sqrt{3}$ см и прямая AM пересекается с высотой треугольника SBC , опущенной из вершины B . Найдите объем пирамиды $SABC$.

Решение:

Равенство всех ребер означает, что пирамида $SABC$ — это правильный тетраэдр. Так как $MA = MB = MC$, то высота из M на плоскость ABC падает в H — центр треугольника ABC . Аналогично, высота из S тоже падает в H . Следовательно, M лежит на прямой SH .

Поскольку прямая AM лежит в плоскости ASH , то она лежит и в плоскости ASN , где N — середина ребра BC . То есть, AM пересекается с высотами SN и BK треугольника SBC . Таким образом, AM проходит через точку пересечения высот L — центр грани SBC , и содержит высоту тетраэдра.

Перейдем к счету. Так как H — центр равностороннего треугольника ABC , то $AH : HN = 2 : 1$. Аналогично, L — центр равностороннего треугольника SBC , поэтому $SL : LN = 2 : 1$. Треугольники NLH и NSA подобны по второму признаку подобия, отсюда $\frac{LH}{SA} = \frac{1}{3}$ и $LH \parallel SA$. Далее треугольники LMH и AMS подобны по первому признаку подобия, следовательно, $\frac{LM}{AM} = \frac{1}{3}$.




Рис. 17: к задаче №8

Имеем: $ML = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $AL = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. Так как тетраэдр правильный, то

$$MH = ML = \frac{\sqrt{3}}{3}, SH = AL = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

По теореме Пифагора для треугольника AMH :

$$AH^2 = AM^2 - MH^2 = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} \Rightarrow AH = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Используя соотношение $AH : HN = 2 : 1$, получим:

$$AN = \frac{3}{2} \cdot AH = \sqrt{6}.$$

Из равностороннего треугольника ABC легко найти сторону, зная его высоту:

$$BC = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot AN = 2\sqrt{2}.$$

Выпишем объем пирамиды:

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} \cdot SH \cdot S_{ABC} = \frac{1}{6} \cdot SH \cdot AN \cdot BC = \frac{1}{6} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8}{3}.$$

Ответ: $\frac{8}{3}$.

Ответы

2011 год

1 вариант

- 1) $\frac{3}{4}; \sqrt{7} + 2$. 2) 5, 7. 3) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. 4) $(\frac{3}{2}; 1)$.
5) -186 . 6) $10; 9 - \sqrt{33}; 14; 15 + \sqrt{33}$ или
 $10; 15 - \sqrt{33}; 14; 9 + \sqrt{33}$. 7) $(-3; +\infty)$. 8) $\frac{1}{3}$.

2 вариант

- 1) $-\frac{2}{3}; \sqrt{5} + 3$. 2) 6, 2. 3) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
4) $(1; \frac{2}{3})$. 5) -175 . 6) $13; \frac{25 - \sqrt{145}}{2}; 17; \frac{35 + \sqrt{145}}{2}$ или
 $13; \frac{25 + \sqrt{145}}{2}; 17; \frac{35 - \sqrt{145}}{2}$. 7) $(6; +\infty)$. 8) $\frac{3}{8}$.

2012 год

1 вариант

- 1) Все три числа являются целыми: 4, 66, 2. 2) $-1; 1$.
3) $\frac{3\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; 0$. 4) 45046. 5) $(0; 1) \cup [7; 2401]$. 6) $\frac{25\sqrt{3}}{2}$.
7) $\left[1 - \frac{2\sqrt{11}}{11}; 1 + \frac{2\sqrt{11}}{11}\right]$. 8) $27 : 5$.

2 вариант

- 1) Все три числа являются целыми: 5, 70, 2. 2) $-2; 2$.
3) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; 0$. 4) 50197. 5) $(0; 1) \cup [11; 1331]$. 6) $\frac{73\sqrt{3}}{2}$.
7) $\left[\frac{11 - 2\sqrt{11}}{7}; \frac{11 + 2\sqrt{11}}{7}\right]$. 8) $18 : 7$.

2013 год

1 вариант

- 1) 12. 2) $(-3\frac{4}{5}; -\frac{1}{5})$. 3) $\pm\frac{2\pi}{27} + \frac{4\pi n}{9}, n \in \mathbb{Z}$. 4) 675.
 5) $(\log_2 12; \log_2 13) \cup [4; +\infty)$. 6) 10. 7) $(116; 6); (6; 116)$. 8) $2; \frac{1}{2}$.

2 вариант

- 1) 4. 2) $(-5\frac{1}{5}; -\frac{4}{5})$. 3) $\pm\frac{4\pi}{33} + \frac{4\pi n}{11}, n \in \mathbb{Z}$. 4) 598.
 5) $(\log_3 6; \log_3 7) \cup [2; +\infty)$. 6) 6. 7) $(5; 95); (95; 5)$. 8) $3; \frac{1}{3}$.

2014 год

1 вариант

- 1) 13. 2) -4. 3) $\pm\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$. 4) $\frac{5}{8}$.
 5) $[-\frac{8}{9}; 0) \cup (0; 1) \cup [2; \frac{10+2\sqrt{145}}{15}) \cup (\frac{10+2\sqrt{145}}{15}; 2\frac{2}{3}]$. 6) $44\sqrt{3}$.
 7) $(1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty)$. 8) 10 см.

2 вариант

- 1) 15. 2) -3. 3) $\pm\frac{\pi}{30} + \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}$. 4) $\frac{511}{198}$.
 5) $[-7\frac{1}{2}; \frac{-13-\sqrt{409}}{8}) \cup (\frac{-13-\sqrt{409}}{8}; -3] \cup (-1; 0) \cup (0; \frac{5}{6}]$. 6) $24\sqrt{3}$.
 7) $(\frac{4-2\sqrt{3}}{3}; +\infty)$. 8) 12 см.

2015 год

1 вариант

- 1) 4,5. 2) 2; 6. 3) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. 4) $(0; 0); (\frac{1}{2}; 4); (\frac{5}{6}; -6\frac{2}{3})$.
 5) $[6; 14)$. 6) $5\sqrt{3}$. 7) $-2\frac{3}{13}; -1\frac{4}{7}$. 8) $27\sqrt{3}$.

2 вариант

- 1) $\sqrt{\frac{20}{7}} + \frac{23}{6}$. 2) 3; 4. 3) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. 4) $(0; 0), (1; 2\frac{1}{2}); (1\frac{1}{2}, -3\frac{3}{4})$. 5) $(-10; -2]$. 6) $6\sqrt{3}$. 7) $-2\frac{4}{7}; -3\frac{3}{13}$. 8) $12\sqrt{3}$.

2016 год

1 вариант

- 1) 1 корень. 2) $(7; 2); (-2; -7)$. 3) 25. 4) $(0; 1) \cup [5; +\infty)$.
5) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$. 6) $\frac{5\sqrt{15}}{4}$. 7) $-34; -2$.
8) $8\sqrt{7}$.

2 вариант

- 1) 1 корень. 2) $(7; 1); (-1; -7)$. 3) 20. 4) $(0; 1) \cup [3; +\infty)$.
5) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2 + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$. 6) $\frac{\sqrt{143}}{4}$. 7) $-32; -2$.
8) $6\sqrt{3}$.

2017 год

1 вариант

- 1) 16; 17. 2) 5; 9. 3) $\frac{511}{45}$. 4) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{7\pi}{12} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $\frac{\pi}{12} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$. 5) $(9; \frac{1}{3}), (\frac{9+\sqrt{105}}{4}; \frac{9+\sqrt{105}}{4})$. 6) $(25; 16)$ и $(16; 25)$.
7) $(-1; 2)$. 8) $\frac{1}{4}$.

2 вариант

- 1) 14; 15. 2) 6; 9. 3) $\frac{1023}{85}$. 4) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{12} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{11\pi}{12} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$. 5) $(4; 2), (\frac{\sqrt{46+4}}{5}; \frac{\sqrt{46-4}}{6})$. 6) $(9; 16)$ и $(16; 9)$.
7) $(-2; 1)$. 8) $\frac{3}{4}$.

2018 год

1 вариант

- 1) 2. 2) 3. 3) $(0, 3) \cup [4, 5; +\infty)$. 4) 4092.
5) $(\operatorname{arctg} 2 + \pi + 2\pi n; (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi k), n, k \in \mathbb{Z}$. 6) 4 : 15. 7) 0; 2.
8) $\frac{8}{3}$.

2 вариант

- 1)** 5. **2)** 2. **3)** $(0, 2) \cup \left[\frac{18}{7}; +\infty\right)$. **4)** 8184.
5) $(\operatorname{arctg} 3 + \pi + 2\pi n; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k)$, $n, k \in \mathbb{Z}$. **6)** $49 : 125$. **7)** $-1; 1$.
8) $8\sqrt{3}$.